

HEAD AND NECK CANCER SCREENING

Head and Neck Cancer Alliance

People with certain risks and symptoms should be considered for screening:

People who use cigarettes, cigars chewing tobacco, snuff and any other oral tobacco are at risk.

People who use alcohol are at risk.

People with the following should also be considered for screening:

- Red or white spot in the mouth that does not heal.
- Sore throat or swollen tonsil.
- Changes in the voice.
- Lump in the neck.
- Earache.
- Difficulty swallowing.
- Family history of thyroid cancer.
- Radiation therapy to the neck area.

CENTRO DE CÁNCER FEIST-WEILLER / DÍA DE LA SALUD FAMILIAR **RECOMENDACIONES PARA LA DETECCIÓN DEL CANCER**

RECOMENDACIONES PARA LA DETECCIÓN DEL CANCER DE LA CABEZA Y CUELLO

Alianza para el cáncer de Cabeza y Cuello.

Personas con los siguientes riesgos y síntomas deberían de considerar hacerse los exámenes de detección de cáncer:

Personas que fuman; cigarros, puros, o mascan tabaco u otra forma oral con contacto del tabaco están en riesgo.

Personas que beben alcohol están en riesgo.

Las personas con los siguientes síntomas deberían considerar hacerse los exámenes:

- Manchas rojas o blancas en la boca que no sanan.
- Dolor de garganta o amígdalas inflamadas.
- Cambios en la voz
- Masas en el cuello
- Dolor de oído
- Dificultad para tragar
- Historia familiar de Cáncer de tiroides.
- Radiación en el área del cuello.