




Sexually Transmitted Infections

**Important Facts: STIs may have NO signs or NO symptoms.
Being infected with one STI may increase your risk of HIV or other STIs.**

	STI	Route of Transmission	Signs (Something you see) Symptoms (Something you feel)	How You Can Protect Yourself
Viral STIs—Not Curable but Treatable and Preventable	Genital Herpes 	HSV-1 & HSV-2; Possible to get from contact during vaginal, anal, oral sex or skin-to-skin contact	-No Symptoms -Genital blisters -Flu-like symptoms -Painful urination	<ul style="list-style-type: none"> -Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Condoms do not cover all areas where the virus can live -May increase risk of HIV infection
	HPV Human Papilloma Virus 	Unprotected contact during vaginal, oral, anal sex or skin-to-skin contact Contact with infected genital skin, mucous membranes, or bodily fluids	-No Symptoms -Genital warts -Can lead to cervical cancer in females -Linked to oral, anal, and penile cancers	<ul style="list-style-type: none"> -Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get vaccinated (ages 9-26) to prevent genital warts and lower the risk of HPV related cancers <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Condoms do not cover all areas where the virus can live
	Hepatitis B 	Exposure to infected blood or body fluids Vaginal, anal, or oral sex Blood transfusions, sharing needles, childbirth	-Abdominal pain -Dark urine -Yellowing of the skin and eyeballs	<ul style="list-style-type: none"> -Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get vaccinated -No IV drug use -Sterile technique when using steroids, getting tattoos or piercings




	STI	Route of Transmission	Signs (Something you see) Symptoms (Something you feel)	How You Can Protect Yourself
Bacterial STIs—Curable with antibiotics	Chlamydia 	Genital contact through vaginal, anal, or oral sex Can be passed from mother to child	-No Symptoms -Burning sensation during urination -Yellow/green discharge from the penis or vagina -Pain in the lower abdomen -Pain in the testicles -Painful in the vagina during intercourse	-Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested Note: -Can cause Pelvic Inflammatory Disease and lead to infertility
	Gonorrhea 	Tends to infect warm and moist areas such as the urethra, eyes, throat, vagina, anus, and the female reproductive tract Unprotected vaginal, anal, or oral sex Can be passed from mother to child	-No Symptoms -Greater urgency of urination -Pus-like discharge or drip from the penis (white, yellow, beige, or greenish) -Swelling or redness at the opening of the penis -Swelling or pain in the testicles -Persistent sore throat -Pain in lower abdomen	-Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested Note: -Can cause Pelvic Inflammatory Disease and lead to infertility -Can be transmitted from a mother to a child
	Syphilis 	Unprotected vaginal, anal, or oral sex Direct contact with infected sores on or in mouth, genitals, and anus	-Has a phase of no symptoms -Chancre sores can appear on the penis or vagina -Swollen lymph nodes -Body rash may occur in the advanced stages -Open sores on mucous membranes -If left untreated, it can cause damage to nervous system, heart disease, brain damage, and death	-Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested to see if syphilis is in latent (hidden) phase

	STIs	Route of Transmission	Signs (Something you see) Symptoms (Something you feel)	How You Can Protect Yourself
Other STIs—Curable with Medication	Trichomoniasis 	Unprotected vaginal, anal, or oral sex	-No Symptoms -Itching inside the penis -Burning after urination or ejaculation -Penile discharge -Itching or redness of the vaginal area -Uncomfortable urination (females) -Vaginal discharge -Vaginal odor	-Don't have sex -Use an external or insertive a condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested Note: -May increase risk of HIV infection by 2 to 4 times
	Pubic Lice (Crabs) 	Vaginal, anal, or oral sex, or close genital contact Can also be passed in sheets, towels, and clothes	-Itching around genitals Sometimes eggs or lice can be seen on pubic hair	-Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam correctly and every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get checked by a doctor
Viral STIs—Not Curable but Treatable and Preventable	HIV Human Immuno-deficiency Virus 	High Risk: Receptive unprotected anal or vaginal sex, sharing needles for IV drugs, many sexual partners, oral sex with ejaculate or vaginal blood Moderate Risk: Unprotected oral sex with no ejaculate or vaginal blood Lower Risk: Protected oral sex on anus, mutual masturbation if there are no cuts on the hand	-A lowered immune system can make you susceptible to frequent illness or infection -Many people with HIV have no symptoms until they progress to having AIDS -Flu-like symptoms (fever, headache, sore throat, swollen lymph nodes) -Open sores in mouth -Can develop into AIDS	-Don't have sex -Use an external or insertive condom or dental dam every time you have vaginal, anal, or oral sex -Get tested -No IV drug use or sharing of needles or other equipment -Sterile technique when using steroids, getting tattoos or piercings -Prevent or decrease risk of contracting or passing HIV through the use of medication Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) or Post Exposure Prophylaxis (PEP) Note: -All people are at some risk of contracting HIV and the only way to know is to GET TESTED -HIV+ individuals can have a normal life expectancy if detected early and remain on antiretroviral medication

Infecciones Transmitidas Sexualmente (ITS)

Importante: Las ITS muchas veces NO tienen síntomas.


Estar infectado con una ITS puede aumentar su riesgo de VIH u otras ITS.

	ITS	Cómo se Transmite	Signos (algo que se ve) Síntomas (algo que se siente)	¿Cómo Puedes Protegerte?
ITS Virales—No son Curables Pero Si Son Evitables	Genital Herpes 	HSV-1 & HSV - 2: Posibilidad de obtener durante el sexo vaginal, sexo anal, sexo oral u piel-a-piel de partes genitales	<ul style="list-style-type: none"> -No Síntomas -Ampollas genitales -Síntomas de la gripe -Dolor al orinar 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales -Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los condones no protegen todas las áreas donde el virus puede vivir -Puede aumentar el riesgo de infección VIH
	VPH Virus del Papiloma Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Contacto no protegido durante sexo vaginal, oral, anal o contacto piel con piel Contacto con la piel infectada genital, las membranas mucosas o fluidos corporales 	<ul style="list-style-type: none"> -No Síntomas -El VPH puede causar cáncer de cuello uterino en las mujeres -Verrugas sobre los genitales -Conectado a canceres anales, orales y del pene. 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales -Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -Niñas y niños (edades 9-26) pueden vacunarse para prevenir las verrugas genitales y disminuir el riesgo de cánceres del VPH <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Los condones no cubren todas las áreas donde el virus puede vivir
	Hepatitis B 	<ul style="list-style-type: none"> La exposición a sangre o fluidos con sangre infectado Sexo oral, sexo vaginal, sexo anal Transfusiones de sangre, compartir agujas, dar luz 	<ul style="list-style-type: none"> -Dolor abdominal -Orina de color oscura -Coloración amarillenta de la piel u ojos 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales -Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral <p>-Técnico estéril con el uso de esteroides, hacerse tatuajes y agujerarse la piel para aretes</p>


	ITS	Cómo se Transmite	Signos (algo que se ve) Síntomas (algo que se siente)	¿Cómo Puedes Protegerte?
S Bacteriales—Curable con antibióticos	Clamidia 	Contacto sexual por sexo oral, sexo vaginal o sexo anal	<ul style="list-style-type: none"> -No Síntomas -Descarga amarilla o verde del pene o de la vagina -Picazón o dolor al orinar -Dolor abdominal -Dolor en los testículos -Para las mujeres, dolor a tener relaciones sexuales 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales - Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -¡Hacerse una prueba de ITS! <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se puede pasar de una madre a un bebe -Puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica y esterilidad en los hombres y las mujeres
	Gonorea 	Sexo oral, sexo vaginal, sexo anal sin protección	<ul style="list-style-type: none"> -No Síntomas -Urgencia de orinar - Descarga (o goteo) del pene (blanco, amarillo, beige, o verdoso) -Inflamación en el orificio del pene -Dolor o inflamación en los testículos -Dolor de la garganta -Dolor abdominal 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales -Use condón externo que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, sexo anal, y sexo oral -¡Hacerse una prueba de ITS! <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica y esterilidad en los hombres y las mujeres -Se puede pasar de una madre a un bebe
	Sífilis 	Sexo oral, sexo vaginal, sexo anal sin protección Contacto directo con llagas infectadas en la boca, o en los genitales, o ano	<ul style="list-style-type: none"> -Tiene una fase de no síntomas -Puede causar daños al sistema nervioso, enfermedades del corazón, daño al cerebral, y muerte -Problemas graves si se pasa a un bebé durante el parto -Llagas pueden aparecer en el pene o la vagina - Ganglios linfáticos se pueden hinchar -Alergia en la piel 	<ul style="list-style-type: none"> -No tener relaciones sexuales - Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -¡Hacerse una prueba de ITS! -Se realiza análisis para comprobar si la sífilis se encuentra en fase latente (escondida)

	ITS	Cómo se Transmite	Signos (algo que se ve) Síntomas (algo que se siente)	¿Cómo Puedes Protegerte?
Otros ITS—Curable con Medicación	Trichomoniasis 	Sexo oral, sexo vaginal o sexo anal sin protección	-Picazón dentro del pene -Picazón o dolor al orinar o eyacular -Picazón en la vagina -Descarga del pene -Descarga anormal de la vagina -Mal olor en la vagina	-No tener relaciones sexuales - Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -Hágase un examen por un médico Nota: -Puede aumentar el riesgo de infección VIH de 2 a 4 veces
	Piojos Púbicos 	Sexo oral, sexo vaginal, sexo anal y contacto cerca de los genitales También se puede transmitir en las sábanas, toallas y ropa	-Comezón alrededor de los partes privadas -A veces los huevos o los piojos se pueden ver en el vello público	-No tener relaciones sexuales - Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -Hágase un examen por un médico
ITS Virales—No son Curables Pero Si Son Evitables	VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana 	Fluidos: Sangre, fluido pre-eyaculatorio, semen, fluidos vaginales, fluido rectal, leche materna Alto Riesgo: Sexo anal receptivo sin protección o el sexo vaginal, compartir agujas para drogas intravenosas, tener muchas parejas sexuales, sexo oral con eyaculación o sangre vaginal Moderado Riesgo: El sexo oral sin protección sin eyaculación o sangre vaginal Mínimo Riesgo: Protegida sexo oral del ano, la masturbación mutua, si no hay cortadas en la mano	-Sistema inmunológico puede hacerse más susceptible a infecciones frecuentes -Muchas personas que tiene SIDA no presentan síntomas hasta que el SIDA está avanzado -Síntomas de la gripe (fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados) -Fuegos en la boca -Puede progresar a la SIDA	-No tener relaciones sexuales - Use un condón externo o que se inserte o un dique dental (dental dam) cada vez que tenga sexo vaginal, anal, oral -Hágase un examen por un médico -No usar drogas intravenosas o compartir agujas u otro equipo -Equipo estéril con el uso de esteroides, hacerse tatuajes y agujerarse la piel para aretes Nota: -Todas las personas corren algún riesgo de contraer el VIH y la única manera de saber es hacerse la prueba del VIH -Prevenir o disminuir el riesgo de contraer o transmitir el VIH a través del uso de la medicación Profilaxis Pre Exposición (PrEP) o Profilaxis Post Exposición (PEP) -Las personas con VIH pueden tener una expectativa de vida normal si el virus es detectado temprano y continúan tomando medicina antirretroviral

STI FLOW CHART



ORGANIGRAMA DE ITS



STI FLOW CHART

