

## 백신 안내문

# 인플루엔자(독감) 백신(사백신 또는 재조합) 백신에 관한 정보

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

백신 정보 안내문은 스페인어 및 다른 언어로도 제공됩니다. [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)를 참조하십시오.

## 1 백신 접종은 왜 하는 건가요?

인플루엔자 백신은 인플루엔자(독감)를 예방할 수 있습니다.

독감은 매년 보통 10월에서 5월 사이에 미국에서 유행하는 전염병입니다. 독감은 누구나 걸릴 수 있지만 특히 더 위험한 사람들이 있습니다. 영유아 및 65세 이상 고령자, 임산부, 특정 질환이 있거나 면역력이 약한 사람은 독감 합병증이 발생할 위험이 가장 높습니다.

폐렴, 기관지염, 부비동염, 중이염 등이 독감과 관련된 합병증입니다. 심장병, 암, 당뇨 등의 질환을 앓고 있는 경우 독감으로 증상이 심해질 수 있습니다.

독감에 걸리면 발열, 오한, 목 아픔, 근육통, 피로감, 기침, 두통, 콧물, 코막힘 등의 증상이 발생할 수 있습니다. 어른보다 어린이에게서 더 일반적이지만 구토와 설사를 하는 경우도 있습니다.

미국에서는 매년 수천 명이 독감으로 사망하며, 그보다 더 많은 사람들이 독감으로 입원하고 있습니다. 독감 백신으로 매년 수백만 건의 질병 및 독감과 관련된 진료를 예방할 수 있습니다.

## 2 인플루엔자 백신

CDC는 생후 6개월 이상부터는 매 독감 시즌마다 백신을 접종하도록 권장하고 있습니다. **생후 6개월부터 8세까지의 어린이**는 한 시즌 동안 **최소 2회** 접종해야 할 수도 있습니다. **그 밖의 사람들은** 한 시즌에 1회 접종하면 됩니다.

접종 후 약 2주 후부터 예방이 가능합니다.

독감 바이러스의 종류는 많으며 항상 바뀝니다. 다가오는 독감 시즌에 독감을 유행시킬 것으로 예상되는 3~4종류의 바이러스를 예방하기 위해 매년 새로운 독감 백신이 생산됩니다. 백신이 이러한 바이러스와 정확히 맞지 않는다고 해도 여전히 어느 정도 예방이 가능합니다.

인플루엔자 백신은 독감을 일으키지 않습니다.

인플루엔자 백신은 다른 백신과 동시에 접종 가능합니다.

## 3 담당 의사와 상의하세요

백신을 맞는 사람이 다음과 같은 경우 담당 의사에게 말씀해 주십시오.

- 이전에 인플루엔자 백신 접종 후 알레르기 반응이 있었거나, 심각하고 생명에 위협이 되는 알레르기가 있는 경우
- 길랭 · 바레 증후군이 있는 경우

의사가 인플루엔자 접종을 다음으로 연기할 수도 있습니다.

감기 등의 가벼운 질병에 걸린 경우에는 접종을 할 수 있습니다. 중간 정도나 심하게 아픈 경우에는 보통 회복 후 접종해야 합니다.

담당 의사가 자세한 사항을 알려줄 것입니다.



## 4 백신 이상 반응 위험

- 인플루엔자 백신 접종 이후 접종 부위의 통증, 발적, 부기, 발열, 근육통, 두통 등이 발생할 수 있습니다.
- 사백신 접종 후(독감 주사) 길랭·바레 증후군이 발생할 위험이 아주 약간 높아질 수도 있습니다.

페렴구균 백신(PCV13) 및/또는 DTap 백신과 동시에 독감 백신을 접종한 아동에게 발열로 인한 발작이 일어날 가능성이 약간 더 있습니다. 독감 백신을 접종한 아동이 발작을 일으키는 경우 담당 의사에게 말씀해 주십시오.

백신 접종을 포함한 의료 시술 이후 실신하는 사람도 종종 있습니다. 어지러움 또는 시력 변화나 이명이 있는 경우 담당 의사에게 말씀해 주십시오.

다른 의약품과 마찬가지로, 매우 희박하지만 백신으로 인해 심각한 알레르기 반응, 심각한 부상 또는 사망에 이를 가능성이 있습니다.

## 5 심각한 이상 반응이 있는 경우에는 어떻게 합니까?

백신 접종을 마친 사람이 진료소에서 나온 후 알레르기 반응이 일어날 수 있습니다. 심각한 알레르기 반응의 징후(두드러기, 얼굴과 목의 부기, 호흡 곤란, 빠른 심장박동, 어지러움, 쇠약감)가 있는 경우 **911**로 연락하고 가장 가까운 병원으로 데리고 가십시오.

우려가 되는 다른 징후가 있는 경우 담당 의사에게 연락하십시오.

이상 반응은 VAERS(Vaccine Adverse Event Reporting System, 백신 이상 반응 보고 시스템)에 보고해야 합니다. 이 보고서는 보통 담당 의사가 제출하고, 환자가 직접 할 수도 있습니다. VAERS 웹사이트 [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov)를 참고하거나 **1-800-822-7967**로 연락하여 주십시오. VAERS는 이상 반응을 보고하기 위한 곳일 뿐, 담당 직원이 의학적 조언을 하지는 않습니다.

## 6 백신 피해 보상 프로그램 (National Vaccine Injury Compensation Program)

VICP(National Vaccine Injury Compensation Program, 백신 피해 보상 프로그램)은 특정 백신으로 인해 피해를 입은 사람들을 보상하기 위한 연방 프로그램입니다. 이 프로그램 및 보상 청구에 관한 사항은 VCIP 웹사이트 [www.hrsa.gov/vaccinecompensation](http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation)을 참고하거나 **1-800-338-2382**로 연락하여 주십시오. 보상 청구 신청에는 기한이 있습니다.

## 7 더 자세한 내용을 알아보려면 어떻게 합니까?

- 담당 의사에게 문의하십시오.
- 지역 또는 주 보건부서에 문의하십시오.
- CDC(질병통제예방센터)에 문의하십시오.
  - 전화: **1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO)**
  - CDC 웹사이트: [www.cdc.gov/flu](http://www.cdc.gov/flu)

Vaccine Information Statement (Interim)  
**Inactivated Influenza Vaccine**



Office use only

8/15/2019 | Korean | 42 U.S.C. § 300aa-26