



特殊教育当面评估指导

这些政策反映了疾病预防控制中心（CDC）的指导方针和要求。

建立评估

为了尽量减少传播的风险，每个评估员将在室外测试站或打开窗户/门的教室内工作，以增加通风。



打喷嚏

如果学生打喷嚏，要求学生处理他们当前佩戴的口罩（如果是重复使用的口罩，让他们把它放在自封袋里）并给学生提供一个替换的一次性口罩。学生打喷嚏后必须用指定教室的水槽洗手。

个人防护措施

除非另有指示或有特殊情况，否则在评估期间及家长接走之前，评估员及学生须戴上口罩。


建议使用组合式面罩和面罩。

在学生和评估员之间放置一个有机玻璃屏障。



吃东西和休息

不允许在试验台/桌子上进食，以防止工作台表面被污染。如果孩子需要休息，他们将被允许在指定的区域休息，由工作人员在安全距离外监督。



保持间距

评估员和学生之间应保持物理距离。如果需要翻译，他们也应该坐在离评审员和学生尽可能远的地方。



与家长重聚

评估员应该用他们的专业判断来决定每一次测试的时间长度。考试结束前约20分钟，评估员或指定成人将致电家长接学生。到达后，家长将留在车内，学生将由工作人员护送到他们身边。

