

# Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante

Evalúe a todos los estudiantes por síntomas potenciales de COVID-19 o exposición

## Riesgo bajo: síntomas generales



Fiebre ( $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ )



Dolor de garganta



Congestión nasal/  
secreción



Dolor de cabeza



Náusea/vómitos  
diarrea



Fatiga/dolor  
muscular o del cuerpo

## Riesgo alto: síntomas de alerta



Tos



Dificultad para respirar



Perdida de gusto/olfato

## ¿Exposición a una persona positiva a COVID-19?

Contacto cercano: menos de 6 pies, más de 15 minutos

NO

▶ 1 síntoma de **riesgo bajo**



Enviar a casa



Regreso a la escuela 24 horas después de la resolución de los síntomas (sin medicación para reducir la fiebre)

▶  $\geq 2$  síntomas de **riesgo bajo**



Enviar a casa



Evaluación por un proveedor atención médica

○ 1 síntoma de **riesgo alto**

1 El proveedor de atención médica confirma el diagnóstico alternativo de los síntomas. Una nota del proveedor de atención médica deberá estar en el expediente. La prueba de PCR del SARS-CoV-2 no es necesaria.



Regreso a la escuela después de 24 horas, sin fiebre y con mejoría de los síntomas

2

**Negativo** en la prueba de PCR del SARS-CoV-2



Regreso a la escuela después de 24 horas, sin fiebre y con mejoría de los síntomas

3

**Positivo** en la prueba de PCR del SARS-CoV-2

○ No visita al proveedor or prueba



**Regreso a la escuela solo después de 10 días desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin fiebre. Poner en cuarentena a los contactos cercanos de casos confirmados. Comuníquese con HCA si tiene preguntas.**

SI



Quedarse en casa \*



**Regreso a la escuela después de 14 días a partir del último contacto, a menos que se desarrollen síntomas. Si se desarrollan síntomas, realizar la prueba de PCR del SARS-CoV-2.**

\*Consultar con la Agencia del Cuidado de la Salud OC (HCA)

Este Árbol de Decisión fue diseñado para ayudar al personal de la escuela y no pretende reemplazar el juicio del médico o establecer un protocolo para todos los pacientes con una condición particular.

El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha supervisión de un proveedor de atención médica calificado. La orientación podría cambiar 09-26-20