

Distrito Escolar de Davis

Protocolo de enfermedad/es

Se recomienda la exclusión temporaria del estudiante de la escuela cuando:

- La enfermedad no permite que su hijo/a estudiante participe en las actividades con comodidad
- La enfermedad requiere un cuidado mayor que el empleado/s escolar puede ofrecer
- El niño/a tiene una de las condiciones siguientes, a no ser que el profesional de salud determina que la condición del o la estudiante no requiere ser excluido de asistir a la escuela
 - **Fiebre** – Temperatura de 100° Fahrenheit (37.78° Celsius) o mayor hasta que la temperatura es normal por 24 horas, sin medicamento para reducir la fiebre.
 - **Parece estar gravemente enfermo**
 - **Somnolencia (adormecido) o malestar general importante** (un sentimiento vago de incomodidad física o desasosiego) como es visto al principio de una enfermedad. El o la estudiante no se siente bien.
 - **Dolor muscular**
 - **Dificultad para respirar**
 - **Dolor de cabeza**
 - **Pérdida del sentido del olfato o el gusto**
 - **Diarrea** - se define como una cantidad no común de materia fecal o materia fecal líquida comparado al hábito normal del niño/a
 - **Sangre en la materia fecal** – que no se explica por un cambio de dieta, medicamento o constipación (estreñimiento)
 - **Vómitos y/o náusea** - más de 2 veces en 24 horas
 - **Dolor abdominal serio**
 - **Dolor abdominal menos serio** – que continúa más de 2 horas
 - **Llagas en la boca** con babeo (baba)
 - **Sarpullido o erupción en la piel con fiebre**
 - **Dolor de garganta** – Si se pueden ver manchas blancas atrás de la garganta o si tiene fiebre, mantenga al niño/a en el hogar.
 - **Nueva tos persistente** – (no relacionada al asma o alergias) – el o la estudiante con un refrió fuerte y tos seca debería estar en el hogar aunque no tenga fiebre
 - **Todo corte de la piel en la etapa de supuración** – a no ser que el corte esté protegido (cubierto) y/o se diagnosticó que no es contagioso
 - **Impétigo** - hasta 24 horas después que se comenzó el tratamiento
 - **Infección de Estreptococo** - (dolor de garganta u otra infección de estreptococo), hasta 12 horas después que se comenzó el tratamiento
 - **Piojos en la cabeza** – Se envió al hogar al final del día hasta después del primer tratamiento (Refiérase al Protocolo de Información sobre Piojos de la cabeza del Distrito Escolar de Davis)
 - **Sarna** – hasta después de que se administre el tratamiento
 - **Toda enfermedad contagiosa** – puede volver a la escuela por instrucción del departamento de salud
 - **Toda condición determinada por el departamento de salud local que contribuya al contagio de la enfermedad durante el brote o período de contagio.**

Muchos estudios han mostrado que la mayoría de los virus se contagian del o la estudiante que parece estar bien, lo cual significa que la exposición al virus sucede antes que los síntomas están presentes en el o la estudiante.

"LA HIGIENE DE MANOS Y SUPERFICIES CONTINÚA SIENDO LA MEJOR MANERA DE REDUCIR LAS INFECCIONES DEL GRUPO EN CUIDADO"

Condiciones que Pueden No Requerir la exclusión escolar del estudiante:

- **Resfrío común, nariz mucosa** (no teniendo en cuenta el color o la consistencia del drenaje nasal)
- **Drenaje amarillo, blanco o lagrimoso de ojos (conjuntivitis o “pink eye”)**
- **Sarpullido o erupción de la piel sin fiebre**
- **MRSA (estafilococo áureo resistente a la meticilina)** – si la herida está cubierta y seca
- **Shingles (herpes Zoster causado por la varicela)** – si la zona de lesión está cubierta y seca
- **Tiña o (ringworm)** (se puede atrasar el tratamiento hasta el final del día)
- **Infección de hongos (thrush)** (manchas blancas en la boca)
- **Eritema infeccioso (quinta enfermedad o fifth disease)** (slapped cheek disease, parvovirus B 19) en un niño/a con problemas inmunes
- **HIV** (Infección del virus de inmunodeficiencia humana), con consideración del riesgo al estudiante u otros infectados con HIV – se decide caso por caso por el profesional de la salud
- **Sarampión (measles)** – 4 días después del comienzo del sarpullido, el o la estudiante puede volver a la escuela
- **Paperas (mumps)** – 4 días después del comienzo de la inflamación de las glándulas parótidas, el o la estudiante puede volver a la escuela
- **Lice** – Si hay liendres (huevos) presentes o si se administró el tratamiento después que se encontraron las liendres con vida

Communicable Disease Bureau (Oficina de Enfermedades Contagiosas), Davis County Health Department (Departamento de Salud del Condado de Davis) y la American Academy of Pediatrics (Academia de Pediatría Americana) Revisado y aprobado por los Servicios de Enfermería y Salud y los Servicios de Enfermería de Educación Especial del Distrito Escolar de Davis