

请不要送生病的学生去学校上学

下面列表提供的是学校的要求, 而非医疗建议。
如果有任何健康问题, 请联系您的医疗健康提供者。



疾病症状



学生可能在...之后返回学校

(下面所列的时间是留在家中所需的最短时间。学生因某些疾病可能会留在家中更长的时间。)

发烧: 体温超过华氏
100.4°F



学生在不服用退烧药的情况下24小时不发烧并且
COVID-19 测试呈阴性, 或如果未测试, 需在家10天。

新的咳嗽或新的呼吸困难



24小时无症状, 并且COVID-19 测试呈阴性, 或如果未测试, 需在家10天。如果诊断为百日咳(咳嗽), 则要求学生
在返校前必须服用5天的处方抗生素药物。

脖子僵硬的头痛或有发烧
的头痛



无症状, 或遵医嘱或学校护士的建议。如果发烧, 请遵循
发烧说明。

腹泻: 每天3次水泻或无法控
制排便



48小时无症状, 或遵医嘱或学校护士的建议。

呕吐: 一次或多次不明
原因的呕吐



48小时无症状, 或遵医嘱或学校护士的建议。

皮疹或烂疮




无症状, 即皮疹消失或烂疮已干或可被绷带完全覆盖, 或
遵医嘱或学校护士的建议。

红眼并有眼睛分泌物:
黄色或棕色的分泌物。



无症状, 即红眼和分泌物消失, 或遵医嘱或学校护士
的建议。

黄疸: 眼睛或皮肤出现新的黄色



遵医嘱或学校护士的建议之后。

无原因的异于寻常的行为:
异常的疲倦, 烦躁或困惑



无症状, 即恢复正常或遵医嘱或学校护士的建议。

重大健康事件, 如生病持续
2周以上或住院



遵医嘱或学校护士的建议之后。

学生的健康状况需要更多的
除学校人员之外的安全照顾

在采取措施保护学生安全之后。