

Productos para el tratamiento de los piojos, aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos

Producto	Descripción	Requiere el uso de un peine para retirar las liendres	Repetición del tratamiento, si fuese necesario
Crema de Permetrina (1%) Nix®	Disponible sin prescripción médica. Aplicar sobre el cabello lavado y secado con toalla, luego enjuagar después de 10 minutos. Aprobado para su uso en niños de 2 meses o más.	Sí	Sí Repetir en 7-10 días si fuese necesario.
Producto a base de piretrina: Diferentes marcas: A-200®, Pronto®, R&C®, Rid®, Medi-Lice®	Disponible sin prescripción médica. Champú o espuma para el cabello. Aplicar sobre el cabello seco y enjuagar después de 10 minutos. No debe usarse en personas alérgicas a los crisantemos	Sí	Sí Repetir en 7-10 días si fuese necesario.
Loción de Malatión (0.5%) Ovide®	Necesita prescripción médica. Aplicar sobre el cabello seco y enjuagar después de 8-12 horas. Aprobado para su uso en niños de 6 años o más. Inflamable puede causar quemaduras químicas.	Sí	Sí Repetir en 7-9 días si fuese necesario.
Loción de alcohol bencílico (0.5%) Ulesfia™	Necesita prescripción médica. Aplicar sobre el cabello seco y enjuagar después de 10 minutos. Repetir en 7 días. No contiene pesticidas neurotóxicos. Aprobada para su uso en niños de 6 meses de edad o más.	Sí	Sí Repetir en 7 días si fuese necesario.
Spinosad suspensión tópica (9%) Natroba™	Necesita prescripción médica. Aplicar sobre el cabello seco y enjuagar después de 10 minutos. Aprobada para su uso en niños de 4 años o más. Hecha de una bacteria que está presente de forma natural en la tierra y actúa paralizando y matando los piojos. También contiene alcohol bencílico.	No	Sí Repetir el tratamiento después de 7 días si se observan piojos vivos.
Loción de Ivermectina (0.5%) Sklice®	Necesita prescripción médica. Aplicar sobre el cabello seco y enjuagar después de 10 minutos. Tratamiento tópico contra los piojos para niños de 6 meses o más; está aprobado para usarse solo una vez. Deseche cualquier medicina sobrante.	No	No Para un solo uso.
Champú de Lindano (1%)	Necesita prescripción médica. Aplicar y dejarlo por 4 minutos. La mayoría de los expertos ya no lo recomiendan.	Sí	No Advertencia de recuadro negro.

Para propósitos informativos solamente. La inclusión no significa aprobación. Información actualizada a partir de 04-15-14.

Referencias: American Academy of Pediatrics-HealthyChildren.org

<http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/from-insects-animals/Pages/Signs-of-Lice.aspx>

Centro para el Control de Enfermedades: <http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.html>