



Prevent the Spread of Infectious Diseases

Feeling ill? Stay home when feeling sick.



Signs & Symptoms of Illness	Helpful Hints	When to Return to School
COVID-19 Symptoms <ul style="list-style-type: none">• Fever and/or Chills• Cough (Unknown cause, not related to asthma or previous respiratory illness, etc.)• Sore throat• Difficulty breathing• Runny nose or Nasal congestion (Unknown cause, not related to allergies or chronic sinus congestion, etc.)• Diarrhea• Nausea/Vomiting (Unknown cause, not related to previous history of abdominal health condition)• Fatigue• Headache (Not related to previous history of headaches or migraines)• Muscle or body aches• Loss of taste or smell	<ul style="list-style-type: none">• Call 9-1-1 if difficulty breathing, persistent chest pain or pressure, confusion, bluish lips or face, and/or unable to arouse.• Contact healthcare provider by phone to determine need for COVID-19 testing• Close contact with a person who has COVID-19 requires self-quarantine (stay at home) until 14 days after exposure. Check temperature twice daily. Contact healthcare provider if symptoms appear.• Inform school health office of suspected (symptoms) or confirmed (positive test results) COVID-19 illness and/or exposure. Resources available.	<p>With a Negative (-) test result or no testing:</p> <ul style="list-style-type: none">• At least 24 hours have passed since last fever without the use of fever-reducing medications and• Other symptoms, if any, have resolved <p>With a Positive (+) test result and no symptoms:</p> <ul style="list-style-type: none">• At least 10 days have passed <i>after date of first positive test</i> and• Symptoms, if any, have resolved <p>With mild to moderate symptoms:</p> <ul style="list-style-type: none">• At least 10 days have passed since onset of symptoms and• At least 24 hours have passed since last fever without the use of fever-reducing medications and• Other symptoms have resolved <p>With Severe illness:</p> <ul style="list-style-type: none">• Isolation may be required up to 20 days after onset of symptoms. Consult with healthcare provider.
Fever: ≥ 100° F ≥ 37.7° C	<ul style="list-style-type: none">• Observe closely. Fever often indicates an illness. If fever persists, seek medical care.	<ul style="list-style-type: none">• At least 24 hours have passed since last fever without the use of fever-reducing medications and• Other symptoms, if any, have resolved.
Cold Symptoms <ul style="list-style-type: none">• Runny nose• Nasal congestion• Cough• Sneezing• Watery eyes	<ul style="list-style-type: none">• Green or yellow nasal drainage may be a sign of infection. If drainage persists, seek medical care.	<ul style="list-style-type: none">• At least 24 hours have passed since symptoms resolved and• No trouble breathing and• No longer feels sick and• Behaviors are normal for student and able to participate at school.
Diarrhea Vomiting	<ul style="list-style-type: none">• Observe closely for serious illness. Frequent diarrhea and/or vomiting can cause dehydration. If symptoms persist, seek medical care.	<ul style="list-style-type: none">• At least 24 hours after symptoms have resolved.• No longer feels sick and• Behaviors are normal for student and able to participate at school.
Earache or Ear Drainage with Sore Throat	<ul style="list-style-type: none">• Earache and/or drainage with sore throat may require antibiotics. Consult with healthcare provider	<ul style="list-style-type: none">• At least 24 hours after starting antibiotic therapy, if needed, and• Ear pain/drainage has resolved and• No difficulty swallowing and• No longer feels sick
Red, Watery Eyes with drainage	<ul style="list-style-type: none">• Possibility of conjunctivitis (Pink Eye). Seek medical care if symptoms persist.	<ul style="list-style-type: none">• Eyes are no longer watery, irritated, or sensitive to light and• Prescribed medication has been started, if needed
Rash	<ul style="list-style-type: none">• May be associated with an infectious disease, particularly with open, oozing, or spreading wounds. Consult with healthcare provider.	<ul style="list-style-type: none">• No open, oozing, or spreading wounds• Healthcare provider documents in writing that rash is not the result of an infectious disease• Healthcare provider documents in writing the period of infectious process – varies from 4 days to two weeks



Prevenir la propagación de enfermedades infecciosas

¿Te sientes enfermo? Quédate en casa cuando te sientas enfermo.



<u>Signos y síntomas de enfermedad</u>	<u>Consejos Útiles</u>	<u>Cuándo regresar a la escuela</u>
Síntomas de COVID-19 <ul style="list-style-type: none">• Fiebre y / o escalofríos• Tos (causa desconocida, no relacionada con asma o enfermedad respiratoria previa, etc.)• Dolor de garganta• Falta de aire o dificultad para respirar• Secreción nasal o congestión nasal (causa desconocida, no relacionada con alergias o congestión nasal crónica, etc.)• Diarrea• Náuseas / vómitos (causa desconocida, no relacionada con antecedentes de problemas de salud abdominal)• Fatiga• Dolor de cabeza (no relacionado con antecedentes previos de dolores de cabeza o migrañas)• Dolores musculares o corporales• Pérdida del gusto u olfato	<ul style="list-style-type: none">• Llame al 9-1-1 si tiene dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, labios o cara azulados y / o no puede despertarse.• Comuníquese con el proveedor de atención médica por teléfono para determinar la necesidad de realizar una prueba de COVID-19• Contacto cercano con una persona que tiene COVID-19 requiere auto cuarentena (quedarse en casa) hasta 14 días después de la exposición. Verifique la temperatura dos veces al día. Comuníquese con el proveedor de atención médica si aparecen síntomas.• Informar a la oficina de salud escolar de la sospecha (síntomas) o confirmada (resultados positivos de la prueba) de enfermedad y / o exposición a COVID-19. Recursos disponibles.	<p><u>Con un resultado de prueba negativo (-) o sin prueba:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y• Otros síntomas, si los hay, se han resuelto <p><u>Con un resultado de prueba positivo (+) y sin síntomas:</u></p> <p>Han pasado al menos 10 días después de la fecha de la primera prueba positiva y</p> <ul style="list-style-type: none">• Los síntomas, si los hay, se han resuelto <p><u>Con síntomas leves a moderados:</u></p> <p>Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas y</p> <ul style="list-style-type: none">• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y• Otros síntomas se han resuelto <p><u>Con enfermedad grave:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Es posible que se requiera aislamiento hasta 20 días después del inicio de los síntomas. Consulte con su proveedor de atención médica.
Fiebre: ≥ 100 ° F ≥ 37.7 ° C	<ul style="list-style-type: none">• Observe de cerca. La fiebre suele indicar una enfermedad. Si la fiebre persiste, busque atención médica.	<ul style="list-style-type: none">• Han pasado al menos 24 horas desde la última fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y• Otros síntomas, si los hay, se han resuelto.
Síntomas de resfriado <ul style="list-style-type: none">• Secreción nasal• Congestión nasal• Tos• Estornudos• Ojos llorosos	<ul style="list-style-type: none">• El drenaje nasal verde o amarillo puede ser un signo de infección. Si el drenaje persiste, busque atención médica.	<ul style="list-style-type: none">• Han pasado al menos 24 horas desde que se resolvieron los síntomas y• Sin problemas para respirar y• Ya no se siente mal y• Los comportamientos son normales para los estudiantes y pueden participar en la escuela.
Diarrea Vómitos	<ul style="list-style-type: none">• Observe de cerca para detectar enfermedades graves. La diarrea y/o los vómitos frecuentes pueden causar deshidratación. Si los síntomas persisten, busque atención médica.	<ul style="list-style-type: none">• Al menos 24 horas después de que se hayan resuelto los síntomas.• Ya no se siente mal y• Los comportamientos son normales para los estudiantes y pueden participar en la escuela.
Dolor de oído o drenaje de oído con Dolor de garganta	<ul style="list-style-type: none">• El dolor de oído y / o supuración con dolor de garganta pueden requerir antibióticos. Consulte con su proveedor de atención médica	<ul style="list-style-type: none">• Al menos 24 horas después de comenzar la terapia con antibióticos, si es necesario, y• El dolor/drenaje de oído se ha resuelto y• Sin dificultad para tragar y• Ya no se siente mal
Ojos rojos y llorosos con supuración	<ul style="list-style-type: none">• Posibilidad de conjuntivitis (ojos rojos). Busque atención médica si los síntomas persisten.	<ul style="list-style-type: none">• Los ojos ya no están llorosos, irritados o sensibles a la luz y• Se ha iniciado la medicación recetada, si es necesario
Sarpullido	<ul style="list-style-type: none">• Puede estar asociado con una enfermedad infecciosa, particularmente con heridas abiertas, supurantes o extendidas. Consulte con su proveedor de atención médica.	<ul style="list-style-type: none">• Sin heridas abiertas, supurantes o extendidas• El proveedor de atención médica documenta por escrito que la erupción no es el resultado de una enfermedad infecciosa.• El proveedor de atención médica documenta por escrito el período del proceso infeccioso: varía de 4 días a dos semanas.