

Fecha: \_\_\_\_\_

Querido(a) padre/madre: \_\_\_\_\_

Su hijo fue visto en la clínica hoy después de recibir una lesión en la cabeza. Su hijo no tenía síntomas inusuales en el momento de la lesión, pero continúa observándolo para detectar cualquier síntoma inusual durante las próximas 24 a 48 horas.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), los niños que parecen neurológicamente normales después de un trauma de cráneo tienen un riesgo muy bajo de deterioro posterior de su condición y es poco probable que requieran intervención médica. También según la AAP, el tratamiento sugerido de un trauma de cráneo es la observación continua por parte de un cuidador competente. Mientras continúa observando a su hijo, llame a su médico para que le aconseje sobre cualquiera de los siguientes síntomas:

somnolencia excesiva	dolor de cabeza	visión borrosa
náuseas y / o vómitos	visión doble	pupilas desiguales
pérdida de coordinación muscular	confusión	mareos
convulsiones	pérdida de la memoria	
sangrado o secreción de la nariz o los oídos		

Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, busque atención médica inmediata:

pérdida del conocimiento	vómitos más de una vez
debilidad o incapacidad para caminar	dolor de cabeza severo
Dificultad extrema para despertar a tu hijo	

Si busca atención médica con respecto a esta lesión, su médico necesitará la información documentada a continuación, así como la aparición de cualquier síntoma adicional que se haya desarrollado mientras se observa en el hogar.

Momento de la lesión \_\_\_\_\_ ¿Pérdida del conocimiento? \_\_\_\_\_

Cómo ocurrió la lesión:

---

---

Síntomas en el momento de la lesión:

---

---

Si tiene alguna pregunta, llame al 740-657-\_\_\_\_.