

**NOTE: ADD PICTURES TO DOCUMENT.**

**KAUFMAN ISD  
USO DE AUTO INYECTOR DE EPINEFRINA**

<b>Instrucciones para uso del Auto inyector EpiPen</b>	<b>Instrucciones para Twinject ® 0.3mg y 0.15mg</b>
<p>Primero remueva el Auto Inyector EpiPen del estuche de plástico Remueva la tapa azul de liberación de seguridad</p>  <p>Sostenga la punta naranja cerca de la parte externa del muslo (aplicar siempre al muslo) Balancee y empuje firmemente la punta naranja contra la parte externa del muslo. Sostenga firmemente por aproximadamente 10 segundos. Retire la EpiPen del muslo y masajee la zona durante 10 segundos.</p>	<p>Remueva las tapas etiquetadas "1" y "2"</p> <p>Coloque la punta redondeada contra la parte externa del muslo, Presione con fuerza hasta que la aguja penetre Mantenga durante 10 segundos y retire</p> <p><b>ADMINISTRACION DE SEGUNDA DOSIS</b></p> <p>Si los síntomas no mejoran después de 10 minutos, administre la segunda dosis.</p> <p>Desatornille la punta redondeada. Saque la jeringa del estuche, sosteniendo el collar azul en la base de la aguja.</p> <p>Deslice el collar amarillo del émbolo. Introduzca la aguja en el muslo y traspase la piel, empuje el émbolo hacia abajo completamente, y retire.</p>
<p><b>Instrucciones para Adrenalick™ 0.3mg and .15mg</b></p>	<p><b>Personal Entrenado para Administrar la EpiPen</b></p>
<p>Remueva la tapa gris etiquetada "1"</p> <p>Remueva la capa gris etiquetada "2" Coloque la punta redondeada roja contra el muslo externo, presione con fuerza hasta que la aguja penetre. Sostenga durante 10 segundos y luego retirela.</p>	<p>1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____</p>

**Monitoreo**

Quédese con el estudiante; alerte al equipo médico y padres. Dígale al escuadrón de rescate que administraron la Epi; Solicite una ambulancia con epinefrina. Tome nota de la hora en que la epinefrina fue administrada. Puede administrar una segunda dosis de epinefrina 5 minutos o más después de la primera dosis si los síntomas continúan o recurren. En caso de una reacción severa, considere mantener al estudiante acostado sobre su espalda con las piernas levantadas. Provea tratamiento para el estudiante, aunque no puedan comunicarse con los padres.

Nombre del Estudiante \_\_\_\_\_ Maestra/o: \_\_\_\_\_  
Enfermera de la Escuela \_\_\_\_\_  
LLAME AL 911/Doctor \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Padre/Tutor \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_