



Protocolo de enfermedad del Distrito Escolar de Davis

Se recomienda la exclusión temporaria de asistir a la escuela cuando:

- La enfermedad no permite que su hijo/a estudiante participe en las actividades con comodidad
- La enfermedad requiere un cuidado mayor que el empleado/s escolar puede ofrecer
- El o la estudiante tiene uno de los síntomas siguientes:
 - **Fiebre** – Temperatura de 100° Fahrenheit (37.78° Celsius) o mayor hasta que la temperatura es normal por 24 horas, sin medicamento para reducir la fiebre.
 - **Parece estar gravemente enfermo, enrojecido, adormecido, letárgico**
 - **Dificultad para respirar**
 - **Diarrea** si es diferente de la cantidad común del o la estudiante
 - **Vómito** más de 2 veces en 24 horas
 - **Llagas en la boca** con babeo (baba) excesivo, no controlable
 - **Dolor persistente que empeora** (en la garganta, estómago, músculo)
 - **Herida de la piel supurante** que no se puede cubrir
 - **Enfermedad contagiosa** o condición como lo determine el departamento de salud

Si los síntomas anteriores se confirman que son debidos a una enfermedad subyacente (otra enfermedad) que no es contagiosa y el o la estudiante se siente bien, se puede eximir la exclusión del estudiante en la escuela. Compruebe con la enfermera/o escolar.

LA HIGIENE DE MANOS Y SUPERFICIES CONTINÚA SIENDO LA MEJOR MANERA DE REDUCIR LAS INFECCIONES DEL GRUPO CUIDADO



Condiciones que **No Pueden** requerir la exclusión de asistencia escolar o el control del contagio de enfermedad

- **Nariz mucosa, estornudos, tos leve, garganta rasposa**
- **Pink Eye (conjuntivitis) ojos rojos o irritados con drenaje blanco, amarillo o lagrimoso mínimo**
- **Tos leve, garganta rasposa**
- **Sarpullido o erupción de la piel sin fiebre**
- **Herida y llaga de la piel que está cubierta y/o seca**
- **Shingles, herpes Zoster causado por la varicela** – si la zona de la lesión está cubierta y seca
- **Infección de hongos (thrush)** (manchas blancas en la boca)
- **Eritema infeccioso (quinta enfermedad o fifth disease)** (slapped cheek disease, parvovirus B 19)
- **Piojos o liendres**
- **Hand and Mouth Disease** (enfermedad de manos y boca) (infección viral)
- **HIV** (Infección del virus de inmunodeficiencia humana)
- **Molluscum contagiosum** (virus del molusco contagioso)
- **Croup** (infección viral del tracto respiratorio)
- **Pinworm** (lombriz intestinal)
- **MRSA** (estafilococo áureo resistente a la meticilina) – si la herida está cubierta y seca

Consideraciones especiales: Regreso escolar después del diagnóstico

- **Sarampión (measles)** – 4 días después del comienzo del sarpullido, el o la estudiante puede volver a la escuela
- **Paperas (mumps)** – 4 días después del comienzo de la inflamación de las glándulas parótidas, el o la estudiante puede volver a la escuela
- **Infección bacteriana de la piel (impétigo)** - después de comenzar el tratamiento
- **Strep Throat** (faringitis o amigdalitis) - hasta 12 horas después que comenzó el tratamiento
- **Scabies** (sarna o escabiosis) - después que comienza el tratamiento
- **Infección de hongos en la piel (ringworm)** - después de comenzar el tratamiento
- **Rubella (rubeola)** - 7 días después de la aparición del sarpullido o erupción
- **Chickenpox (varicela)** - hasta que todas las lesiones de piel están secas y endurecidas (con cáscara)
- **Pertussis (tos ferina)** - hasta después de 5 días de tratamiento

Si tiene preguntas y necesita más información, consulte con la enfermera/o escolar.

Sitio Web del Departamento de Servicios de Enfermería del Distrito Escolar de Davis

Fuente: American Academy of Pediatrics (Academia de pediatras americanos)

Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools (El control de enfermedad en guarderías y las escuelas)

Revisado y aprobado por los Servicios de Salud y Enfermería y los Servicios de Enfermería de Educación

Especial del Distrito Escolar de Davis