



Chester Community Charter School

Carta de Piojos para Padres

Lice Letter for Parents: Spanish

Date _____

Estimado Padre/Guardián,

Recientemente se han detectado varios casos de piojos en la cabeza en nuestra escuela. La infestación de piojos le puede pasar a cualquiera. De hecho, los piojos ocurren con mayor frecuencia en cabezas limpias en lugar de en las sucias. Los piojos no son un peligro para la salud pública y no propagan enfermedades. Los piojos **no saltan ni vuelan** y no vivirán de un humano por más de uno o dos días, two, ya que necesitan calor y sangre para sobrevivir.

La Academia Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control de Enfermedades y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, no apoyan la exclusión de la escuela por piojos o liendres.

SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES A CONTINUACIÓN, PUEDE DETENER EL SPREAD DE LICE EN SU FAMILIA Y LA COMUNIDAD CCCS.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Revise el cabello de su hijo usando una buena fuente de luz o linterna y lupa si es necesario. Comience en el escote y proceda por toda la cabeza en busca de signos de manchas blancas / grisáceas (nits) o para piojos que se arrastran en vivo. *(Las manchas blancas que fácilmente desde el eje del cabello es la caspa. Nits firmemente incrustados en el tallo del cabello.)*
- Impresione a su hijo para no **compartir peines, barrettes de cabello, scrungies, bufandas de sombreros, cascos o abrigos.**

MEDIDAS ACTIVAS CUANDO OBSERVA NITS O LICE LIVE

- **SI PREGNANTO O ENFERMEDAD LLAMA A SU PROVEEDOR DE CUIDADO HEALTH ANTES DE TRATAMIENTO PARA LAS INSTRUCCIONES.**
- Utilice un tratamiento de licencia apropiado, como:
- *Rid- seguro para niños de 2 años de edad y mayores. Segundo tratamiento recomendado 9-10 días después de la inicial
- Tratamiento.
- *Nix- seguro para niños de 2 meses de edad y mayores. Segundo tratamiento recomendado el día 9 después de tratamiento inicial.

(Por favor, dé la vuelta)

Carta de Piojos para Padres

- **Es importante seguir las instrucciones EXACTAMENTE COMO SE ESTABLECE EN LA CAJA**, ya que algunos niños con pelo sin pelo más largo que la longitud del hombro pueden requerir dos cajas para **tratar**.
- ***NO UTILICE UN SHAMPOO/CONDICIONADOR DE COMBINACIONES ANTES DE UTILIZAR LICE MEDICINE. NO VUELVA A LAVAR EL CABELLO DURANTE 1-2 DÍAS DESPUÉS DE RETIRAR EL MEDICAMENTO PARA PIOJOS.***
- **No trate a una persona infestada más de 2-3 veces con el mismo medicamento si continúa viendo piojos vivos. Consulte a su proveedor** de atención médica, ya que su hijo puede ser resistente al medicamento.
- Retire **TODOS** los piojos y liendres del cabello con el peine de dientes finos que se proporciona en **sukit**.
- Remoje todos los peines y cepillos domésticos en agua caliente (al menos 130 grados F) durante al menos 5-10 minutos.
- Use el peine de dientes finos durante las próximas 2-3 semanas para peinar el cabello de su hijo, remojeen en agua caliente después de cada uso.
- Lave a máquina y seque la ropa, las líneas de cama y otros artículos que la persona infestada usó o usó durante los 2 días antes del tratamiento utilizando el ciclo de lavandería (agua caliente 130 grados F) y el ciclo de secado por calor alto. La ropa y los artículos que no son lavables pueden limpiarse en seco o sellarse en una bolsa de plástico y almacenarse durante 2 semanas.
- Vacíe el suelo y los muebles, especialmente donde la persona infestada se sentó o se acostó.
- Informe a los miembros de la familia, las guarderías y otras personas que estén en estrecho contacto con su hijo, para ayudar a prevenir una mayor infestación por piojos.
- Cuando su hijo regrese a la escuela, envíe la parte superior de la caja de medicamentos, almacene la recepción de medicamentos o la descripción del tratamiento a la enfermera.

Saludos

Servicios de salud

CDC: Centros para enfermedades
Control y Prevención