


# ¿Necesito una dosis primaria adicional o una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19?



En la mayoría de las situaciones son preferibles las dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech o Moderna (vacunas ARNm contra el COVID-19). Para las personas de entre 5 y 17 años, SOLO se puede usar la vacuna de Pfizer. Para más información, hable con su médico. Por favor, traiga su tarjeta de vacunación a la cita para recibir una dosis primaria adicional o una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19.

## TABLA A: Personas Inmunocomprometidas de forma moderada o grave

- En tratamiento contra el cáncer
- Receptor de un trasplante de órganos
- Receptor de un trasplante de células madre en los últimos 2 años
- Toma medicación para suprimir el sistema inmunológico
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- En tratamiento con altas dosis de corticoides

# ¿Necesito una dosis primaria adicional o una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19?

¿Está usted moderada o gravemente inmunocomprometido? (véase la **Tabla A** a continuación)

**Si** Ver el reverso de este folleto

**NO** estoy moderada o gravemente inmunocomprometido

¿Qué vacuna recibió?

J&J

Pfizer

Moderna

¿Necesito una dosis adicional a la serie inicial?

No se recomienda una dosis adicional a la serie inicial. Véase debajo la recomendación sobre la dosis de refuerzo.

No se recomienda una dosis adicional a la serie inicial. Véase debajo la recomendación sobre la dosis de refuerzo.

No se recomienda una dosis adicional a la serie inicial. Véase debajo la recomendación sobre la dosis de refuerzo.

¿Es mayor de 12 años?

**Si**

**No**

¿Necesito una dosis de refuerzo?

Debería recibir una dosis de refuerzo, al menos, 2 meses después de la dosis inicial única, un total de 2 dosis.

Debería recibir una dosis de refuerzo, al menos, 5 meses después de completar la serie inicial, un total de 3 dosis.

En este momento, no se recomienda ninguna dosis de refuerzo.

Debería recibir una dosis de refuerzo, al menos, 5 meses después de completar la serie inicial, un total de 3 dosis.

¿Es mayor de 50 años?

**Si**

**No**

¿Recibió la vacuna J&J TANTO en su serie inicial como en su primera dosis de refuerzo?

**Si**

**No**

¿Necesito una segunda dosis de refuerzo?

Debería recibir una segunda dosis de refuerzo, al menos, 4 meses después de recibir la primera dosis de refuerzo, un total de 3 dosis.

Debería recibir una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19, al menos, 4 meses después de recibir la primera dosis de refuerzo, un total de 3 dosis.

En este momento, no se recomienda una segunda dosis de refuerzo.

¿Es mayor de 50 años?

**Si**

**No**

Debería recibir una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19, al menos, 4 meses después de recibir la primera dosis de refuerzo, un total de 4 dosis.

En este momento, no se recomienda una segunda dosis de refuerzo.

¿Es mayor de 50 años?

**Si**

**No**

Debería recibir una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm contra el COVID-19, al menos, 4 meses después de recibir la primera dosis de refuerzo, un total de 4 dosis.

En este momento, no se recomienda una segunda dosis de refuerzo.

En la mayoría de las situaciones son preferibles las dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna (vacunas ARNm-mRNA- contra el COVID-19). Para las personas de 12 a 17 años, sólo se puede utilizar Pfizer. Para más información, hable con su médico. Por favor, traiga su tarjeta de vacunación para recibir una dosis primaria adicional o una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19.

**TABLA A: Personas Inmunocomprometidas de forma moderada o grave**

- En tratamiento contra el cáncer
- Receptor de un trasplante de órganos
- Receptor de un trasplante de células madre en los últimos 2 años
- Toma medicación para suprimir el sistema inmunológico
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- En tratamiento con altas dosis de corticoides