

Calendario de vacunación escolar obligatorio y recomendado de Indiana 2021-2022



GRADO	VACUNAS OBLIGATORIAS		VACUNAS RECOMENDADAS
Preescolar	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 4 DTTa (difteria, tétanos y tosferina acelular) • 3 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Varicela • 1 SRP (sarampión, rubéola y paperas) • 2 Hepatitis A 	<ul style="list-style-type: none"> • Antigripal anual
Nivel inicial (K) a 5.º grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTTa • 4 Polio 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Varicela • 2 SRP • 2 Hepatitis A 	<ul style="list-style-type: none"> • Antigripal anual
De 6.º a 11.º grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTTa • 4 Polio • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 SRP • 2 Hepatitis A • 1 MCV4 (meningocócica) • 1 DTTa de refuerzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Antigripal anual • 2/3 PVH (papilomavirus humano) • Vacuna de COVID (para estudiantes de 12 años en adelante)
12.º grado	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Hepatitis B • 5 DTTa • 4 Polio • 2 Varicela 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 SRP • 2 Hepatitis A • 2 MCV4 • 1 DTTa de refuerzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Antigripal anual • 2/3 PVH • 2 Meningococo grupo B • Vacuna de COVID

Hepatitis B: la edad mínima para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la Hepatitis B es de 24 semanas.

DTTa: se aceptan 4 dosis de DTTa/DTT/DT si la cuarta se le dio a partir de los 4 años.

Polio*: se aceptan 3 dosis contra la poliomielitis para todos los grados si la tercera dosis fue a partir de los 4 años y si transcurrieron 6 meses de la dosis anterior.

* Para los estudiantes entre nivel inicial (K) y 10.º grado, la última dosis debe darse a partir de los 4 años con 6 meses entre una dosis y otra.

Varicela: la constancia de enfermedades previas emitida por el médico, con el año y el mes, sirve como prueba de inmunidad para los niños que ingresan a preescolar y hasta 12.º grado. No se aceptan informes de los padres sobre los antecedentes de enfermedades.

DTTa de refuerzo: no hay un intervalo mínimo que deba transcurrir desde la última dosis de DT.

MCV4: las personas que reciban la primera dosis a partir de los 16 años solo necesitan 1 dosis de la vacuna.

Hepatitis A: el intervalo mínimo que debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis es de 6 meses calendarios. Los niños entre preescolar y 12.º grado deben contar con 2 dosis.

División de vacunación del Departamento de Salud del Estado de Indiana | (800) 701-0704

