
FENTANILO EL ASESINO INVISIBLE

Las drogas pueden contener un nivel mortal de fentanilo. No se puede ver, saborear ni oler. Es casi imposible saber si una droga está mezclada con fentanilo a menos que se pruebe con una tira de prueba de fentanilo.

El fentanilo es un opioide sintético que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, a menudo letal con tan solo 2 miligramos.








una pastilla mata | no tome una decisión mortal




Las pruebas de laboratorio de la DEA revelan que





La intoxicación por fentanilo es la principal causa de muerte para las personas de 18 a 45 años en EE. UU.*



QUÉ HACER SI CREE QUE ALGUIEN TIENE UNA SOBREDOSIS:

Puede ser difícil saber si una persona está drogada o tiene una sobredosis. Si no está seguro, lo mejor es tratar la situación como una sobredosis—


podría salvar una vida.

- Llame al 911 inmediatamente.
- Aplique Naloxona o Narcan, si las tiene.
- Intente mantener a la persona despierta y respirando.
- Coloque a la persona de lado para evitar que se ahogue.
- Permanezca con ella hasta que llegue el personal de emergencia.

Aplique Naloxona o Narcan, si las tiene.



Coloque a la persona de lado para evitar que se ahogue.



 Los narcotraficantes disfrazan las pastillas que contienen el peligroso fentanilo para que parezcan medicamentos recetados de forma legítima, e incluso las disfrazan de caramelos para dárselas a los niños.



• El fentanilo está afectando a personas con y sin trastornos por consumo de sustancias.

CÓDIGOS DE EMOJI COMUNES







Descargo de responsabilidad: estos emojis reflejan ejemplos comunes encontrados en las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Esta lista no es exhaustiva y las imágenes anteriores son una muestra representativa.

Riesgos de Sobredosis

Amplia variación en el contenido y la fuerza de las drogas ilícitas.


Tomar múltiples medicamentos

Antecedentes de consumo de drogas o sobredosis de drogas

Mezcla de drogas:

- "Downers": Alcohol, Benzodiazepines, other opioids
- "Uppers": Cocaine, stimulants like Adderall, meth

Cómo le afecta la sobredosis de opioides sintéticos.



SIGNOS DE <u>SOBREDOSIS</u>



LA PERSONA NO SE MUEVE



LA RESPIRACION ES LENTA O AUSENTE



LA PERSONA S E ESTA AHOGANDO



PUEDE ESCUCHAR SONIDOS DE GORGOTEOS



LA PIEL SE SIENTE FRIA Y SUAVE



LAS PIPILAS SON PEQUEÑAS



LABIOS Y UÑAS SON AZULES



LA PERSONA NO PUEDE SER DESPERTADA

PARA AYUDA LLAMA AL 911



QUICK START GUIDE **Opioid Overdose Response Instructions**

Use NARCAN Nasal Spray (naloxone hydrochloride) for known or suspected opioid overdose in adults and children.

Important: For use in the nose only.

Do not remove or test the NARCAN Nasal Spray until ready to use.

Identify Opioid Overdose and Checkfor Response

Ask person if he or she is okay and shout name.

Shake shoulders and firmly rub the middle of their chest.

Check for signs of opioid overdose:

- Will not wake up or respond to your voice or touch
- · Breathing is very slow, irregular, or has stopped
- Center part of their eye is very small, sometimes called "pinpoint pupils"

Lay the person on their back to receive a dose of NARCAN Nasal Spray.



Remove NARCAN Nasal Spray from the box. Peel back the tab with the circle to open the NARCAN Nasal Spray.











Give NARCAN Nasal Sprav

Hold the NARCAN nasal spray with your thumb on the bottom of the plunger and your first and middle fingers on either side of the nozzle.

Gently insert the tip of the nozzle into either nostril.

 Tilt the person's head back and provide support under the neck with your hand. Gently insert the tip of the nozzle into one nostril, until your fingers on either side of the nozzle are against the bottom of the person's nose.

Press the plunger firmly to give the dose of NARCAN Nasal Spray.

. Remove the NARCAN Nasal Spray from the nostril after giving the dose.

Get emergency medical help right away.


Move the person on their side (recovery position) after giving NARCAN Nasal Spray.


Watch the person closely.


If the person does not respond by waking up, to voice or touch, or breathing normally another dose may be given. NARCAN Nasal Spray may be dosed every 2 to 3 minutes, if available.

Repeat Step 2 using a new NARCAN Nasal Spray to give another dose in the other nostril. If additional NARCAN Nasal Sprays are available, repeat step 2 every 2 to 3 minutes until the person responds or emergency medical help is received.










Opioid-Associated Emergency for Lay Responders Algorithm



*For adult and adolescent victims, responders should perform compressions and rescue breaths for opioid-associated emergencies if they are trained and perform Hands-Only CPR if not trained to perform rescue breaths. For infants and children, CPR should include compressions with rescue breaths.

Preguntas Secundarias



- ¿Por qué crees que las muertes por fentanilo han aumentado tan rápidamente?
- ¿Cómo podría el término "sobredosis" ser inapropiado para el fentanilo?
- ¿Si no tienes acceso a Narcan, cómo puedes ayudar a alguien que encuentras inconsciente?