



Septiembre 2023

Estimados padres y tutores:

Los padres y tutores deben conocer los procedimientos del Distrito para los estudiantes que experimentan una reacción alérgica grave y potencialmente mortal o una sobredosis de narcóticos mientras están en la escuela. **Debido a que el tratamiento incluirá Benadryl (difenhidramina) y epinefrina, es su responsabilidad notificar a la enfermera de la escuela por escrito al recibir esta carta si su hijo alguna vez ha tenido una reacción a cualquiera de los tratamientos.**

**I. Estudiantes con una condición conocida que amenaza la vida: La enfermera escolar cumplirá** las órdenes escritas del médico de familia - MD. Las órdenes del médico de familia y el permiso de los padres para el tratamiento deben ser presentados por la familia y mantenidos en la historia clínica del estudiante en la Oficina de Salud. Los medicamentos se mantendrán en la Oficina de Salud o serán llevados por el estudiante, si así lo ordena el médico de familia del estudiante.

**II. Reacciones inesperadas:** no hay antecedentes de alergias pero desarrolla síntomas (picazón, enrojecimiento, urticaria, angioedema)-nota-si **el angioedema implica labios o lengua o se producen cambios en la voz, esto se considerará una emergencia médica potencialmente mortal-consulte la Sección A a continuación:**

- La enfermera observará en la boca para observar la hinchazón de la lengua
- La enfermera verificará la presión arterial y el pulso del estudiante y lo comparará con las grabaciones anteriores en la tabla. Si es significativamente menor, esto se considerará una emergencia.
- Si pica un insecto, aplique hielo.
- Benadryl por vía oral (ver más abajo).
- Informe a los padres y al médico.
- Observe el progreso de los síntomas.

**A. Reacciones graves inesperadas y potencialmente mortales (sin antecedentes previos):**

Los síntomas incluyen: hinchazón (especialmente ojos y lengua), dificultad para respirar, cambio en la voz, alteración de la conciencia, mareos, mala circulación, sibilancias, caída de la presión arterial, pulso débil y rápido, piel fría y sudorosa.

Primeros auxilios inmediatos –

- Administrar la inyección de Epi-Pen  
Menos de 50 lb – 0.15cc (Epi-Pen Jr.) Más de 50 lbs. – 0>3cc (Epi-Pen)
- Llame al 911 para transporte al hospital
- Notificar al administrador y al padre
- Repita la dosis de Epi-Pen a los 5 minutos si los síntomas no disminuyen o si empeoran.
- Sigue con Benadryl  
Menos de 50 libras – 1 cucharadita (12.5 mg) Más de 50 libras – 2 cucharaditas (25 mg)

**III. En caso de que sea necesario administrar Narcan (naloxona, un antídoto opiáceo (narcótico)) - -**

1. Se dará de acuerdo con la política de la Junta de Educación
2. Se llamará al 911 para su transporte al hospital.
3. Los padres y el administrador serán notificados.

**IV. Uso de Albuterol:**

Si el médico personal del estudiante ha ordenado albuterol, los estudiantes pueden llevar su medicamento recetado o puede mantenerse en la Oficina de Salud para su uso según sea necesario. La orden escrita de los médicos personales debe ser presentada por la familia para que se mantenga archivada en la oficina de enfermería de la escuela. La Oficina de Salud también mantendrá el albuterol de stock para los estudiantes con una orden escrita de un médico personal en el archivo de la enfermera de la escuela.

**Si tiene más preguntas, comuníquese con la oficina de salud de la escuela de su hijo.**

Sinceramente

William Maliha, MD Director Médico, Distrito Escolar Central de Saugerties