

# Guía de Requisitos de Inmunización en Oklahoma: Año Escolar 2019-20

Todos los niños de dos meses de edad o mayor deben presentar un record de inmunización o solicitar una exención antes de ser permitidos a atender cuidado de niños o una escuela en Oklahoma. Por favor lea los puntos abajo para información esencial.

Edad/Grado	Inmunizaciones requeridas con dosis cumulativas requeridas	Inmunizaciones recomendadas
<b>Cuidado de Niños</b> <i>Al día para la edad</i>	4 DTaP (difteria, tétano, tos ferina) 1-4 PCV Neumocócica ( ) ◆ 1-4 Hib ( <i>Haemophilus influenzae</i> del tipo B) ◆ 1 MMR (sarampión, paperas, rubeola) 1 Varicela	3 IPV (polio) 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B) Influenza estacional (flu)
<b>Preescolar/Pre-K</b>	4 DTaP (difteria, tétano, tos ferina) 1 MMR (sarampión, paperas, rubeola) 1 Varicela	3 IPV (polio) 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B) Influenza estacional (flu) 2 <sup>da</sup> varicela a 4 años de edad Polio en o después del 4 <sup>to</sup> cumpleaños
<b>Kindergarten-6to</b>	5 DTaP (difteria, tétano, tos ferina) ★ 2 MMR (sarampión, paperas, rubeola) 1 Varicela	4 IPV (polio) ◀ 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B (hepatitis B) Influenza estacional (flu) 2 <sup>da</sup> varicela a 4 años de edad Polio en o después del 4 <sup>to</sup> cumpleaños
<b>7<sup>to</sup>-12<sup>o</sup></b>	1 Tdap (tétano, difteria, tos ferina) 5 DTaP (difteria, tétano, tos ferina) ★ 2 MMR (sarampión, paperas, rubeola) 1 Varicela	4 IPV (polio) ◀ 2 Hep A (hepatitis A) 3 Hep B ■ (hepatitis B) Influenza estacional (flu) 2-3 VPH (virus del papiloma humano) 1-2 MCV4 (Meningocócica ACWY) 2-3 Men B (serotipo B meningocócica)

- El horario actual de inmunizaciones infantiles puede ser encontrado en <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html>.
- Dosis administradas 4 días o menos, antes de los intervalos mínimos o edades, son contadas como dosis válidas. Esto no aplica al intervalo mínimo de 28 días entre dosis de vacuna viva no administrada en el mismo día.
- Si un padre reporta que su hijo tuvo la enfermedad de varicela, entonces el niño no es requerido a recibir la vacuna varicela. Registre que el niño tuvo la enfermedad.
- La primera dosis de vacunas de sarampión, paperas, y rubeola (MMR), varicela, y hepatitis A deben ser administradas en o después del primer cumpleaños del niño (o dentro de 4 días antes de su cumpleaños) si no, deben ser repetidas.
- No es necesario re-empezar la serie de cualquier vacuna si una dosis fue dada tarde o si una dosis esta vencida. Intervalos más largos de lo recomendado en medio de dosis no afecta la inmunidad.
- Los niños pueden ser permitidos a atender cuidado de niños y la escuela si han recibido, aunque sea una dosis de todas las vacunas requeridas para su edad o grado y la siguiente dosis aun no sea requerida, pero deben de completar las dosis de vacunas que faltan a tiempo. Estos niños están "en el proceso" de recibir inmunizaciones.
- Niños que asisten a instalaciones de cuidado de niños licenciadas deben de estar al día con las vacunas para su edad enumeradas en la columna "Cuidado de niños".
- Las vacunas Hib y PCV no son requeridas para estudiantes en pre-escolar, pre-kindergarten, o programas de kindergarten operadas por escuelas al menos que la instalación sea una instalación de cuidado de niños licenciada. Las vacunas Hib y PCV son requeridas para niños asistiendo instalaciones de cuidado de niños.
- ★ Si la 4ta dosis de DTaP es administrada en o después del 4to cumpleaños del niño, la 5ta dosis de DTaP no es requerida.
- ◆ El número de dosis de PCV y/o Hib puede variar de 1 a 4 dependiendo de la edad del niño cuando la primera dosis fue dada y el tipo de vacuna de Hib usada.
- ◀ Si la 3ra dosis de IPV es administrada en o después del 4to cumpleaños del niño y por lo menos 6 meses de la dosis previa, entonces la 4ta dosis de IPV no es requerida.
- Estudiantes de 11 a 15 años de edad quienes no han recibido la vacuna Hep B pueden recibir una serie de 2 dosis de la vacuna de Adultos Hepatitis B Merck® para cumplir con este requisito. Todos los otros niños (menor o más grande) deben recibir 3 dosis de la vacuna pediatra de Hepatitis B.