

Manténme en casa si.....



<p>Vómitos: 2 o más Ocasiones durante las últimas 24 horas.</p>	<p>1. Tiene erupción y no se siente bien y tengo comezón. Tengo un sarpullido y fiebre.</p> <p>2. abiertas Llagas abiertas deben estar cubiertas o haber pasado 24 horas después de haber comenzado el tratamiento, si ha sido recetado.</p> <p>3. Piojos: tratamiento se ha hecho contra los piojos.</p>	<p>Diarrea: 2 o más veces durante las últimas 24 horas.</p> <p>Y cualquier momento que hay sangre en las heces.</p> <p>Diarrea con fiebre</p>	<p>Cualquier sospecha de infección contagiosa tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infecciones de la piel: Sarna, impétigo, MRSA, • las infecciones respiratorias La gripe, la Tos Ferina <p>Alerta: Antes que el niño pueda regresar debe haber pasado por lo menos 24 horas después de que se inició tratamiento con receta O una nota del médico.</p>	<p>Dolor de garganta y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobre un appetite • Fiebre • Irritable 	<p>No me siento bien... ..</p> <p>Cansado Pálido Falta de apetito Confusión Estoy irritable Tengo Fiebre</p>	<p>Fiebre: De 100 grados F bajo el brazo u oral 101 grados F y tienen uno o más de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolor de cabeza • Dolor de oído • Erupción • Fatiga • Dolor de garganta <p>Alerta: Fiebre sin signos o síntomas en bebés menos de 2 meses</p>
--	---	--	--	--	---	--

Manténme en casa si.....



						necesitan atención médica inmediato.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Cuando su hijo(a) está enfermo(a):

1. Tenga planes para el cuidado de su niño/a.
2. Avise a la maestra de su niño/a, aunque se quede en casa.