

Autorización para los medicamentos suministrados por la NFA

Los medicamentos enumerados a continuación serán suministrados por el Centro médico a aquellos estudiantes que hayan completado adecuadamente los consentimientos para medicamentos. Firme cada página, tache los medicamentos para los que no da su autorización. **La (el) enfermera(o) escolar tiene mi permiso para administrar los siguientes medicamentos según lo ordenado por el Consejero Médico de la NFA, «cuando sea necesario» durante la jornada escolar.**

Nombre del estudiante: _____ Fecha de nacimiento: _____ Grado: _____

Alergia a medicamentos: _____

Medicamentos de venta libre	Dosis y hora	Afecciones o síntomas	Posibles efectos secundarios	Comentarios
Tylenol (acetaminofén)	650 mg cada 4 horas, cuando sea necesario (o 15 mg/kg)	Malestar general o fiebre	Náuseas, ictericia, dolor abdominal	
Pepto Bismol (subsalicilato de bismuto)	30 ml o 2 cucharadas cada 1/2 a 1 hora, según sea necesario. Puede repetirse 1 vez	Diarrea, náuseas, acidez, indigestión, malestar estomacal	Sangrado, zumbido de oídos, pérdida de audición	
Maalox (hidróxido de aluminio / hidróxido de magnesio)	2 cucharaditas, cuando sea necesario, 1 dosis	Acidez, indigestión, presión, hinchazón	Estreñimiento, diarrea, aumento de la sed, retortijones de estómago	
Aquaphor Petrolato al 41 %	Aplicar según sea necesario.	Protector de la piel, picaduras de insectos, quemaduras		
Caladryl promoxina, acetato de zinc	Aplicar según sea necesario, no más de 3 a 4 veces por día	Alivia el dolor, la picazón debida a irritación cutánea menor, sarpullidos, picaduras, cortaduras		
Gel para quemaduras de lidocaína al 2 %	Aplicar según sea necesario sobre el área afectada, no más de 3 a 4 veces por día	Quemaduras menores		
Visina Tetrahidrozolina, sulfato de zinc	1 a 2 gotas en el ojo afectado, hasta 4 veces por día	Alivio temporal del malestar o enrojecimiento del (de los) ojo(s) debido a una irritación ocular menor	Leve ardor o escozor ocular, visión borrosa, ojos llorosos, dilatación de las pupilas	

Autorización del padre/madre/tutor para la administración de los medicamentos anteriores

Firma del padre/madre/tutor: _____ Fecha: _____

Medicamentos de venta libre	Dosis y hora	Afecciones o síntomas	Posibles efectos secundarios	Comentarios
Aerosol cloraséptico, Fenol al 1.4 %	Aplicar en el área afectada (1 rociada) dejar actuar por 15 segundos y luego escupirlo, puede repetirse cada 2 horas	Alivio temporal de pequeñas irritaciones/dolores ocasionales, dolor de garganta, dolor de boca	Dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito, sarpullido, reacción alérgica, hinchazón	
Benadryl Difenhidramina 12.5 mg/5 ml	10 ml (25 mg) si pesa menos de 88 libras 20 ml (50 mg) si pesa más de 88 libras, 1 dosis. Notificar a los padres	Urticaria/erupción - reacción alérgica, picaduras de abeja	Somnolencia. Mareo. Deterioro de la coordinación. Dolor de cabeza. Malestar epigástrico. Sequedad de las membranas mucosas. Estimulación del SNC, paradójica	
Bacitracina de 500 unidades	Limpiar la zona, aplicar una pequeña cantidad sobre la zona 1 a 3 veces por día	Primeros auxilios para ayudar a prevenir una infección de las cortaduras, raspaduras y quemaduras menores		
Gel de aloe vera	Aplicar abundantemente a la piel quemada por el sol o irritada según sea necesario	Humectante para la piel quemada por el sol y/o reseca		

Autorización del padre/madre/tutor para la administración de los medicamentos anteriores

Firma del padre/madre/tutor: _____ Fecha: _____

Cada año escolar, se requiere de una nueva autorización