



Should My Child Go to School Today?

IT IS OK TO GO TO SCHOOL WITH

- ✓ Common Cold
- ✓ Runny Nose
 - Regardless of the color or consistency of the drainage as long as the child can take care of the drainage themselves
- ✓ Cough
- ✓ Eye Drainage
 - Without fever, eye pain or eyelid/eyeball redness
- ✓ Rash
 - Without fever or behavior changes
- ✓ Lice Eggs (Nits)
 - Long hair should be pulled back

If your child has three or more symptoms, they need to be seen by their healthcare provider.

PLEASE KEEP YOUR CHILD HOME IF

- ✗ Child Appears to be Severely Ill
 - Not responsive, irritable, persistent crying, difficulty breathing, quickly spreading rash
- ✗ Fever of 100.4 or Higher
 - Stay home until fever free for 24 hours without fever reducing medications
- ✗ Diarrhea
 - Stay home if pooping more frequently or is loose and not related to dietary changes
 - Stay home until free of diarrhea for 24 hours without medication to control the frequency/consistency
- ✗ Vomiting - 2 or more times in the last 24 hours
 - Stay home until no vomiting for 24 hours without medication to stop the vomiting and eating has resumed
- ✗ Rash
 - With fever or behavior changes
 - Stay home until the healthcare provider diagnoses cause
- ✗ Strep Throat
 - Stay home until student has had 2 doses of antibiotics prescribed by a doctor (12 hours apart)
- ✗ Live Lice
 - May return to school after first treatment



¿Debería ir mi hijo a la escuela hoy?

ESTÁ BIEN IR A LA ESCUELA CON

- ✓ Resfriado común
- ✓ Secreción nasal
 - Independientemente del color o la consistencia del drenaje mientras el niño pueda hacerse cargo del drenaje ellos mismos
- ✓ Tos
- ✓ Drenaje ocular
 - Sin fiebre, dolor ocular o enrojecimiento de los párpados/globos oculares
- ✓ Sarpullido
 - Sin fiebre ni cambios de comportamiento
- ✓ Huevos de piojos (liendres)
 - El pelo largo debe ser recogido hacia atrás

Si su hijo tiene tres o más síntomas, debe ser visto por su proveedor de atención médica.

POR FAVOR, MANTENGA A SU HIJO EN CASA SI

- ✗ Niño parece estar gravemente enfermo
 - No responde, irritable, llanto persistente, dificultad respiración, erupción que se extiende rápidamente
- ✗ Fiebre de 100.4 o más
 - Quedarse en casa hasta que no haya fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre
- ✗ Diarrea
 - Quedarse en casa si defeca con más frecuencia o está suelto y no está relacionado con los cambios en la dieta.
 - Permanecer en casa hasta que este libre o sin diarrea durante 24 horas sin medicación para controlar la frecuencia/consistenciay
- ✗ Vómitos - 2 o más veces en las últimas 24 horas
 - Permanecer en casa hasta que no haya vómitos durante 24 horas sin medicamentos para detener el vómito y ha reanudado la alimentación.
- ✗ Sarpullido
 - Sin fiebre ni cambios de comportamiento
 - Quedarse en casa hasta el diagnóstico del proveedor de atención médica sobre la causa
- ✗ Faringitis estreptocócica
 - Quedarse en casa hasta que el estudiante haya tomado 2 dosis de antibióticos prescrito por un médico (con 12 horas de diferencia)
- ✗ Piojos vivos
 - Puede regresar a la escuela después del primer