

CUÁNDO DEBE PERMANECER SU HIJO EN CASA Y NO IR A LA ESCUELA

Como parte de nuestro compromiso con el bienestar de nuestros estudiantes, aquí tiene una guía sobre cuándo podría ser necesario mantener a su hijo en casa debido a enfermedad. Esta información tiene como objetivo ayudar a tomar decisiones sobre la salud de su hijo y su asistencia a la escuela.

	SÍNTOMAS	 QUÉDATE EN CASA	 REGRESO A LA ESCUELA
	FIEBRE	Si la temperatura es superior a 100.4°F sin medicación para reducir la fiebre.	Cuando esté libre de fiebre durante 24 horas sin medicación.
	TOS/CONGESTIÓN	Si la tos o congestión es severa, causa dificultad para respirar, o va acompañada de fiebre.	Cuando los síntomas mejoren o sean leves y manejables.
	VÓMITO/DIARREA	Si hay más de dos episodios de vómito o diarrea.	24 horas después del último episodio, sin medicación.
	ERUPCIÓN CON FIEBRE	Si una erupción va acompañada de fiebre o cambios de comportamiento.	Después de que un proveedor de atención médica haya dado el alta.
	VARICELA	Hasta que todas las ampollas se hayan secado.	Generalmente alrededor de una semana después del inicio de los síntomas, pero consulte con un proveedor de atención médica.
	CONJUNTIVITIS (OJO ROSADO)	Si hay secreción ocular y el niño no puede participar en actividades normales.	Después de 24 horas de tratamiento antibiótico, si es bacteriana, o cuando los síntomas mejoren.
	DOLOR DE GARGANTA	Si va acompañado de fiebre o inflamación de las glándulas en el cuello.	Después de estar libre de fiebre durante 24 horas sin medicación o con una nota del proveedor de atención médica.

Tenga en Cuenta:

- Esta información no sustituye el consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento.
- Si tiene preguntas específicas o necesita asesoramiento sobre la salud de su hijo, por favor contacte a un proveedor de atención médica calificado o comuníquese con la enfermera de la escuela.
- Las pautas proporcionadas están en línea con las recomendaciones de salud pública, pero no deben interpretarse como directivas médicas.