



Greenwich Public Schools
School Health Services

RSV (VRS - Virus Respiratorio Sincitial)

Estimados padres:

Se ha diagnosticado RSV (Respiratory Syncytial Virus, por sus siglas en inglés) en el salón de clases de su hijo. El RSV es una enfermedad contagiosa causada por un virus respiratorio llamado virus sincitial respiratorio. Vigile atentamente a su hijo y notifique a su médico si desarrolla alguno de los siguientes signos o síntomas que se enumeran a continuación.

¿Cuáles son los signos o síntomas?

- Rinorrea
- Disminución del apetito
- Tos
- Estornudos
- Fiebre
- Sibilancia

¿Cuáles son los períodos de incubación y contagio?

- Período de incubación: 4 a 6 días
- Período contagioso: 1 a 2 días después de que aparecen los signos o síntomas hasta al menos 3-8 después de la aparición del RSV.

¿Cómo se propaga?

- Una persona infectada tose o estornuda.
- Usted recibe gotitas de virus al toser o estornudar en los ojos, la nariz o la boca.
- Tienes contacto directo con el virus.
- Tocas una superficie que tiene el virus y luego tocas su cara antes de lavarte las manos.

¿Cómo lo controlas?

- **Lo más importante es lavarse las manos con jabón con frecuencia y cuidado.** Los niños y adultos deben cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser con un pañuelo desechable si es posible, o con el brazo si no hay pañuelos disponibles. Lávese las manos después del contacto con pañuelos desechables o cualquier artículo sucio y deséchalo después de cada uso.

¿Cuál es el tratamiento?

- Llame al médico de su hijo si tiene los síntomas anteriores y fiebre. Los virus no se tratan con antibióticos, pero su médico le aconsejará sobre los cuidados de apoyo para su hijo mientras esté enfermo. Informe los episodios de RSV confirmado (diagnosticado por un médico) a la oficina de la enfermera lo antes posible.

¿Cuándo puede regresar mi hijo a la escuela?

- Su hijo podrá regresar a la escuela cuando sus síntomas hayan mejorado significativamente y pueda participar en las actividades del día escolar. **SU HIJO NO PUEDE REGRESAR HASTA QUE DEJE DE TENER FIEBRE DURANTE 24 HORAS SIN TOMAR TYLENOL O MOTRIN. ¡¡NUNCA LES DÉ ASPIRINA!!**

Si tiene alguna pregunta, llame a la enfermera de su escuela.