

Когда не пу с кать ребенка в школу или детский сад

Ниже приведены рекомендации, когда следует оставить ребенка дома, если он плохо себя чувствует. Свяжитесь с поставщиком медицинских услуг, если ваш ребенок нуждается в медицинской помощи. Для возвращения в школу или детский сад справка от врача обычно не требуется. Для получения дополнительной информации посетите [страницу рекомендаций CDPH](#).




Симптом болезни	Когда мой ребенок должен оставаться дома и когда он может вернуться?
 <p>В общем плохо себя чувствует</p>	<p>ОСТ АВАЙТ ЕСТЬДОМА, ЕСЛИ какое-либо новое заболевание или симптом мешает ребенку полноценно участвовать в повседневной деятельности.</p>
 <p>Высокая температура</p>	<p>ОСТ АВАЙТ ЕСТЬДОМА, ЕСЛИ температура поднялась до 100,4°F (38°C) или выше.</p> <p>ВОЗ ВРАЩАЙТЕСЬ, КОГДА лихорадка прошла ночью и прошла утром без использования таких лекарств, как Тайленол®, Адвил®, , или Мотрин® (ацетаминофенил ибупрофен).</p>
 <p>Рвота</p>	<p>ОСТ АВАЙТ ЕСТЬДОМА, ЕСЛИ рвота возникла 2 или более раз в течение 24 часов.</p> <p>ВОЗ ВРАЩАЙТЕСЬ, КОГДА рвота прекратится за ночь и ваш ребенок сможет удерживать жидкость и пищу. Рекомендовать частое мытье рук.</p>
 <p>Диарея</p>	<p>ОСТ АВАЙТ ЕСТЬДОМА, ЕСЛИ стул вашего ребенка может вытечь из-под подгузника или если он вряд ли уснет до туалета (если он приучен горшку). Если стул выглядит кровавым или черным обратитесь за медицинской помощью.</p> <p>ВОЗ ВРАТ ПРИ улучшении. Рекомендовать частое мытье рук.</p>



Отсканируйте QR-код и найдите последнюю версию этого флаера.

Когда не пускать ребенка в школу или детский сад



Симптом болезни	Когда мой ребенок должен оставаться дома и когда он может вернуться?
 <p>Больное горло</p>	<p>МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ЛЕГКИХ СИМПТОМАХ. Пожалуйста, рассмотрите возможность ношения маски, если возраст 2 года и старше.</p> <p>ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ в случае затрудненного дыхания или глотания или постоянного слюнотечения.</p> <p>ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПРИ УЛУЧШЕНИИ. Если назначен антибиотик, примите первую дозу как минимум за 12 часов до возвращения.</p>
 <p>Симптомы простуды такие как кашель, заложенность / насморк, чихание.</p>	<p>МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ЛЕГКИХ СИМПТОМАХ. Пожалуйста, рассмотрите возможность ношения маски, если возраст 2 года и старше.</p> <p>ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ при серьезных симптомах, включая сильный кашель, затрудненное дыхание или затрудненное дыхание, а также свистящее дыхание, если его не контролируют лекарства (например, альбутерол).</p> <p>ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПРИ УЛУЧШЕНИИ. Если после возвращения вашему ребенку понадобятся лекарства, сообщите об этом на сайт.</p>
 <p>Раздражение ушей или глаз, включая розовый глаз</p>	<p>МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ЛЕГКИХ СИМПТОМАХ. Рекомендовать частое мытье рук.</p> <p>ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ из-за проблем с зрением или слухом, травмой глаз или боли, которую они не могут терпеть.</p>
 <p>Сыпь</p>	<p>МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ЛЕГКИХ СИМПТОМАХ.</p> <p>ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ если сыпь усиливается, вызывает боль, имеет волдыри или не заживает.</p> <p>ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ПРИ УЛУЧШЕНИИ или по указанию врача. В целом при таких заболеваниях, как ветряная оспа, стригущий лишай, чесотка и опрелости ваш ребенок может вернуться, как только закончено соответствующее лечение.</p>