





# Коли тримати дитину вдома, щоб не допустити до школи чи догляду за дитини



Нижче наведено пропозиції щодо того, коли залишати дитину вдома, коли вона почувається погано. Зверніться до лікаря, якщо ваша дитина потребує медичної допомоги. Довідка в лікаря, як правило, не потрібна для повернення до школи чи догляду за дитиною. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, введіть [сторінку керувати центром CDPH](#).



Симптом хвороби	Коли моя дитина повинна залишатися вдома, коли вона може повернутися?
 <p>Загалом, погане самопочуття</p>	<p><b>ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА, ЯКЩО</b> будь-яка нова хвороба або симптом заважає дитині повноцінно брати участь у звичайних заняттях.</p>
 <p>Лихоманка</p>	<p><b>ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА, ЯКЩО</b> температура становить 100,4° F (38° C) або вище.</p> <p><b>ПОВЕРНЕННЯ</b>, КОЛИ лихоманка зникла протягом ночі та зникла вранці без використання таких ліків, як Tylenol®, Advil®, Motrin® (ацетамінофен або ібупрофен).</p>
 <p>блювання</p>	<p><b>ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА, ЯКЩО</b> блювота виникла 2 або більше разів протягом 24 годин.</p> <p><b>ПОВЕРНІТЬСЯ</b>, КОЛИ блювота закінчилася протягом ночі, ваша дитина зможе утримувати рідину та їжу. Рекомендуйте часте миття рук.</p>
 <p>діарея</p>	<p><b>ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА, ЯКЩО</b> стілець вашої дитини може витекти з підгузника або якщо вона не встигне встигнути в туалет (якщо вона привчена до горщика). Якщо стілець виглядає кривавим або чорним, зверніться до лікаря.</p> <p><b>ПОВЕРНЕННЯ ПРИ</b> Удосконаленні. Рекомендується часте миття рук.</p>



Відскануйте QR-код, знайдіть останню версію цього листівки.

# Коли тримати дитину вдома, щоб не допустити до школи чи догляд за д ітьми



Біль у горл

Коли моя дитина повинна залишатися вдома коли вона може повернутися?

**ДОБРЕ ЗВЕРНУТИСЯ З ЛЕГКИМИ СИМПТОМАМИ.** Будь ласка, подумайте про нос іноні маски, якщо в ік 2 роки або старше.

**ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ТА ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МЕДИКА** у раз ітрудненого дихання чи ковтання або пост іного слинотеч і.

**ВІДДАЧА ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ.** Якщо призначений антиб іотик, прийм іть першу дозу принайм і за 12 годин до повернення.



Симптоми застуди, так як кашель, закладен ість/ нежить, чхання

**ДОБРЕ ЗВЕРНУТИСЯ З ЛЕГКИМИ СИМПТОМАМИ.** Будь ласка, подумайте про нос іноні маски, якщо в ік 2 роки або старше.

**ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ТА ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ** у раз і важких симптом ів, включаючи сильний кашель, ітруднене дихання або проблеми з перехопленням дихання, або свистяче дихання, якщо його не можна контролювати л іками (наприклад, альбутеролом).

**ВІДДАЧА ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ.** Якщо ваш і дитин і знадобляться л іки п ісля повернення, зв'яж іться з сайтом, щоб пов ідомити ії.



Подразнення вух або очей, включаючи рожеві оч

**ДОБРЕ ЗВЕРНУТИСЯ З ЛЕГКИМИ СИМПТОМАМИ.**

Рекомендуйте часте миття рук.

**ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ТА ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО МЕДИКА**

через проблеми і з зором або слухом, травму ока або б іль, який вони не можуть терп іти.



Висип

**ДОБРЕ ЗВЕРНУТИСЯ З ЛЕГКИМИ СИМПТОМАМИ.**

**ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ТА ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО МЕДИКА**

якщо висип посилюється, викликає б іль, має пухир і або не загоюється.

**ПОВЕРНЕННЯ ПРИ ПОКРАЩЕННІ** або за вказ івками медичного прац івника. Загалом, при таких захворюваннях, як вош і, мпетиги, стригучий лишай, короста та гострики, ваша дитина може повернутися, як т ільки почне в ідпов ідне л ікування.