



Reasons to Keep Your Child Home from School

You should keep your child at home if he/she might spread an illness to other children. Children who are sick have a difficult time participating in class and learning.

<p><u>Fever</u> Children with a temperature of 100.4°F (38°C) or higher should stay at home until there is no fever for 24 hours without the use of fever reducing medications. If your child returns to school with a fever, he/she could still be contagious.</p>	<p><u>COVID-19</u> Notify the school immediately if your child has tested positive or has been in contact with someone who has COVID-19. Follow the school's return guidance for COVID-19.</p>	<p><u>Vomiting</u> Any child who has vomited twice in 24 hours should stay home. Your child may return to school after 24 hours of NO vomiting or fever.</p>	<p><u>Diarrhea</u> One event of watery diarrhea is reason for your child to stay home from school. Your child may return after 24 hours of NO diarrhea. Call your child's doctor if fever, rash, dehydration, or weakness are present.</p>
<p><u>Persistent Cough</u> If your child's cough is worse than you would expect with a cold, keep your child home from school. If he/she suddenly develops a cough, has a hard time breathing, or has a fever, call your child's doctor.</p>	<p><u>Sore throat</u> If your child has a severe sore throat or a sore throat with a fever, headache, or stomachache, keep your child home and call your child's doctor.</p>	<p><u>Pain (ear, head, stomach)</u> If pain disrupts your child's participation in regular activities or is accompanied by fever, nausea/vomiting, or sore throat, keep child home and call your child's doctor.</p>	<p><u>Chickenpox</u> Your child should stay at home until all bumps are scabbed and no new bumps have shown up for two days. **Most children have received the vaccine for chickenpox (Varicella vaccine)</p>
<p><u>Pinkeye/Conjunctivitis</u> If your child has red eye(s) with drainage that is cloudy or yellow, crusting, and/or pain, call your child's doctor. If child has bacterial conjunctivitis, he/she may return after beginning treatment.</p>	<p><u>Scabies</u> Your child should stay home for 24 hours after treatment. Scabies is a contagious disease caused by a mite. Itching and a rash will be noted.</p>	<p><u>Head Lice</u> Keep your child home and treat, making sure all live lice are eliminated. Nit removal will need to be done daily. Contact your school for more information. **Child cannot return to school with live lice.</p>	<p><u>Impetigo</u> If your child has impetigo (red, oozing blister areas with yellow-gold scabs on the body or face), he/she should stay home until doctor says it's OK for child to return.</p>

- When there is doubt in your mind about sending your child to school, consult your child's doctor.
- Make sure that your child's school knows how to reach you during the day. Remember to update your phone contact numbers throughout the school year.

Resources:
Children's Healthcare of Atlanta
American Academy of Pediatrics

Rev.10/2021



Razones para dejar a su niño en la casa y no enviarlo a la escuela

Su niño debe quedarse en casa si tiene alguna enfermedad que pueda contagiarle a los demás. Los niños que están enfermos tienen dificultades para participar en clase y aprender.

<p><u>Fiebre</u> Los niños que tienen fiebre de 100.4° F (38°C) o más, deben permanecer en casa hasta que ya no tengan fiebre por un período de 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si su niño regresa a la escuela teniendo aún fiebre entonces podría contagiar a los demás.</p>	<p><u>COVID-19</u> Notifique a la escuela de inmediato si su niño ha dado positivo o ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19. Siga las instrucciones para el regreso a clases referentes a COVID-19.</p>	<p><u>Vómito</u> Cualquier niño que haya vomitado dos veces en las últimas 24 horas debe quedarse en casa. El niño podría regresar a la escuela luego de que ha pasado 24 horas sin vomitar o sin fiebre.</p>	<p><u>Diarrea</u> Un evento de diarrea líquida es un motivo para que el niño permanezca en casa. Su niño podría regresar a clases luego de que ha pasado 24 horas sin diarrea. Llame al doctor si tiene fiebre, salpullido, deshidratación o debilidad.</p>
<p><u>Tos Persistente</u> Si la tos de su niño es más grave de lo que sería normal debido a un resfriado, déjelo en la casa. Si le da tos de repente, tiene dificultad para respirar o tiene fiebre, llame al doctor.</p>	<p><u>Dolor de garganta</u> Si su niño tiene un grave dolor de garganta o dolor de garganta con fiebre, dolor de cabeza o dolor de estómago, déjelo en casa y llame al doctor.</p>	<p><u>Dolor (oído, cabeza, estómago)</u> Si el dolor impide la participación del niño en actividades normales o si está acompañado por fiebre, náusea, vómito o dolor de garganta, déjelo en casa y llame al doctor.</p>	<p><u>Varicela</u> Su niño debe permanecer en casa hasta que todas las ampollas o granos hayan formado costras y hasta que hayan pasado dos días sin ampollas nuevas. ** La mayoría de los niños han recibido la vacuna contra la varicela.</p>
<p><u>Conjuntivitis</u> Si su niño tiene los ojos rojos con una secreción amarillenta o turbia, con formación de costra y con dolor, llame al doctor. Si tiene una conjuntivitis bacteriana podría regresar una vez que comience el tratamiento.</p>	<p><u>Sarna</u> Su niño debe permanecer en casa durante 24 horas después del tratamiento. La sarna es una enfermedad contagiosa causada por un ácaro. Sentirá un sarpullido y picazón.</p>	<p><u>Piojos</u> Deje al niño en casa y hágale un tratamiento, asegurándose de eliminar todos los piojos vivos. Deberá eliminar las liendres diariamente. Comuníquese con la escuela para más información. ** Los niños con piojos vivos no pueden regresar a la escuela.</p>	<p><u>Impétigo</u> Si su niño tiene impétigo (ampollas rojizas purulentas que revientan y producen costras color miel en el cuerpo o en la cara), debe permanecer en casa hasta que el doctor le autorice y diga que está bien para que regrese a la escuela.</p>

- Cuando tenga la duda de si debe enviar a su niño a la escuela, consulte con el pediatra.
- Asegúrese que en la escuela del niño sepan como comunicarse con usted durante el día. Recuerde mantener actualizada su información telefónica durante el año escolar.

Fuentes:
Children's Healthcare of Atlanta
American Academy of Pediatrics