

Guía de salud estudiantil del Distrito Escolar de Westminster

La siguiente guía se ha desarrollado para ayudarlo a determinar cuándo su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela.

En la mayoría de las situaciones, cualquier estudiante que desarrolle síntomas nuevos e inexplicables no debe regresar al plantel escolar hasta que esté claro que los síntomas son leves y están mejorando o se deben a una causa no infecciosa. En algunos casos, se puede solicitar la documentación de un proveedor de atención médica.

<p>Prueba positiva del COVID-19 Por favor, notifique a la oficina de la escuela si la prueba de su estudiante da positiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El estudiante debe aislarse y/o quedarse en casa y regresar a la escuela cuando: <ul style="list-style-type: none"> ○ El estudiante no tiene fiebre durante 24 horas SIN usar medicamentos para reducir la fiebre (y) ○ El estudiante se siente bien sin síntomas o los síntomas son leves y mejoran
<p>SÍNTOMAS</p>	<p>¿Deberá su estudiante quedarse en casa o ser regresado de la escuela a casa?</p>
<p>FIEBRE</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenta una fiebre de 100.4°F o más alta, o si el estudiante actúa enfermo o el estudiante no puede participar cómodamente en las actividades escolares <p>Es obligatorio: Permanecer en casa hasta que hayan transcurrido 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.</p>
<p>Congestión/ Secreción nasal/Tos/ Garganta irritada</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las actividades escolares • Tiene dificultad para respirar • Tiene tos persistente o secreción nasal que no se puede manejar fácilmente • Tiene sibilancia, no ha sido evaluado previamente y no hay un tratamiento disponible
<p>Dolor de cabeza/Fatiga/ Dolores musculares o corporales</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los síntomas no desaparecen después de descansar • El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las actividades escolares • Existe historia reciente de lesión en la cabeza
<p>Diarrea/Vómito</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiene diarrea/vómito 2 o más veces durante las últimas 24 horas, mantenga al estudiante en casa por 24 horas después del último episodio • El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las actividades escolares • El estudiante usa pañales y el pañal no contiene heces • Existe historia reciente de lesión en la cabeza
<p>Irritación de ojos y/o conjuntivitis (Pink eye)</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiene los ojos rojos con secreción nasal amarilla/de mucosidad significativa • Hay un brote en el salón de clase o un proveedor de atención médica lo recomienda <p>➤ <i>Si los ojos no tienen secreción, el estudiante puede quedarse en la escuela</i></p>
<p>Sarpullido/irritación en la piel</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiene sarpullido significativo • Tiene una supuración/herida abierta con secreción activa <p>➤ <i>Si el sarpullido no tiene secreción y está cubierto por un pequeño vendaje, él/ella puede quedarse en la escuela.</i></p> <p>Es obligatorio: El estudiante puede regresar a la escuela libre de sarpullido o con una nota de un proveedor de atención médica que indique que la condición del estudiante no es infecciosa.</p>
<p>Dolor de estómago</p>	<p>Su estudiante debe quedarse en casa o irse a casa de la escuela si:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El estudiante se ve/actúa enfermo o no puede participar cómodamente en las actividades escolares • Tiene dolor severo continuo por más de dos horas • El dolor está asociado con diarrea o vómito, heces negras/con sangre o dolor estomacal después de una lesión

