

HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS PASTILLAS DE FENTANILO

El Fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.



2 GRANOS DE FENTANILO DEL TAMAÑO DE LA SAL PUEDEN MATAR

EXISTEN DOS TIPOS DE FENTANILO:

Fentanilo farmacéutico

- Recetado por un médico licenciado y adquirido en una farmacia acreditada.

Fentanilo de fabricación ilícita (IMF, en inglés)


- Fabricado y distribuido a través de mercados de drogas ilegales, sin control de calidad.

LAS PASTILLAS ILEGALES NO VIENEN CON NINGUNA LISTA DE INGREDIENTES ACTIVOS O INACTIVOS.

EL FENTANILO NO SE VE, NO TIENE OLOR NI SABOR.

El Fentanilo de fabricación ilegal (IMF) suele mezclarse con otras drogas por su potencia extrema, haciendo que las drogas sean:

- más baratas de fabricar
- más potentes
- más adictivas
- más peligrosas



BRECHA DEL CONOCIMIENTO

Sólo el 58% de los jóvenes conocía que el Fentanilo era peligroso.

PASTILLAS FALSIFICADAS AKA QUE CONTIENEN FENTANILO

Son píldoras que se fabrican para parecerse a los medicamentos de venta con receta médica que se adquieren en las farmacias.

Se parecen a los medicamentos reales en:

- ✗ su tamaño, color, sello de la marca, y embalaje

Las pastillas falsas pueden contener más o menos cantidad del principio activo del medicamento, ingredientes dañinos para la salud o incluso ingredientes que no tengan que ver con la medicación en sí.

Las píldoras falsas se fabrican para que se parezcan a los opioides de receta médica como la oxicodona (Oxycontin®, Percocet®), la hidrocodona (Vicodin®), y el alprazolam (Xanax®) o a los estimulantes como las anfetaminas (Adderall®).

Una píldora, o incluso la mitad de la pastilla, puede ser letal. La experimentación con estas pastillas o la automedicación puede ser mortal.


Las personas suelen desconocer que el fentanilo se ha agregado a las pastillas que se compran en las redes sociales, que se consiguen a través de un amigo-a o que se compran en línea y que, por lo tanto, no son las verdaderas pastillas.

Los únicos medicamentos que son seguros son los que han sido recetados por profesionales médicos licenciados o acreditados. Las pastillas que se compran fuera de una farmacia acreditada son ilegales, peligrosas y potencialmente letales.

109,360

MUERTES POR SOBREDOSIS EN 2022 ALIMENTADAS POR EL FENTANILO

7 DE CADA 10* PASTILLAS CONTIENEN UNA DOSIS POTENCIALMENTE LETHAL




2018 - 2021 LAS MUERTES DE ADOLESCENTES DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS AUMENTARON EN UN 356%

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDE

Reconocer los signos de una sobredosis de opioide puede salvar una vida. Estos son algunos de los más comunes:

- Pupilas pequeñas y contraídas
- Quedarse dormido-a ó perder el conocimiento.
- Respiración lenta, débil o nula.
- Sonidos de axfisia, gorgoteo o ronquidos.
- Cuerpo flácido.
- Piel fría y/o húmeda.
- Piel descolorida (sobre todo en los labios y las uñas).

Puede que sea difícil predecir que alguien está experimentando una sobredosis. En caso de duda, lo mejor es siempre considerar que se trata de una sobredosis y llamar al 911 inmediatamente – puede salvar una vida.



In 2021, el 66,8% de las muertes de sobredosis de drogas tuvieron, al menos, una gran oportunidad de intervención.

La Naloxona es un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides y salvar vidas.

