

I NEED TO STAY HOME IF...

I HAVE A FEVER	I AM VOMITING	I HAVE DIARRHEA	I HAVE A RASH	I HAVE HEAD LICE	I HAVE EYE CONCERNS	I HAVE BEEN IN THE HOSPITAL
						
Temperature of 100.4° or higher.	Vomiting has occurred 2 or more times within 24 hours.	Child is unlikely to make it to the toilet in time. If stool looks bloody or black, seek medical attention.	Okay to attend with mild symptoms. Stay home if rash is worsening, causing pain, has blisters, or is not healing.	Active head lice. May stay in school until end of the school day and apply treatment at home. All live lice must be removed prior to returning to school.	Vision changes. Injury to the eye involving forceful impact or penetration of the eye. Pain or discomfort the child cannot tolerate.	Hospital stay and/or ER Visit.

I AM READY TO GO BACK TO SCHOOL WHEN I AM...

Fever went away in the night - without the use of fever reducing medication. i.e. Tylenol, Advil or Motrin.	Vomiting has ended overnight, and child is able to hold down liquids and food in the morning.	Once symptoms are improving.	Once symptoms are improving or as guided by health care provider.	Treated with appropriate lice treatment at home.	Evaluated by my doctor and have note to return to school.	Released by my medical provider to return to school.
---	---	------------------------------	---	--	---	--

NECESITO QUEDARME EN CASA CUANDO...

Tengo fiebre	Estoy vomitando	Tengo diarrea	Tengo salpullido	Tengo piojos	Tengo una molestia en el ojo	He estado en el hospital
						
Temperatura de 100.4° o más alta.	Vomito que ha ocurrido 2 o más veces dentro de 24 horas.	Cuando el niño no puede llegar al baño a tiempo. Si los heces contienen sangre o se ven negros, buque ayuda médica.	Puede asistir a clases si los síntomas son leves. Debe quedarse en casa cuando empeora, o si causa dolor, ampollas o no está mejorando.	Comenzó en la cabeza, piojos vivos. Puede quedarse el resto del día escolar y tiene que aplicar tratamiento contra piojos en casa. Todos los piojos vivos deben ser eliminados antes de regresar a la escuela.	Cambios de visión. Heridas al ojo involucrando impacto o penetración del ojo. Dolor o molestia que el niño no pueda tolerar.	Visita al hospital y/o emergencias.

ESTOY LISTO PARA REGRESAR A LA ESCUELA CUANDO...

La fiebre termino la noche anterior – sin el uso medicamentos para reducir la fiebre. P.ej. Tylenol, Advil o Motrin.	El vómito termino la noche anterior, y el niño puede retener líquidos y comida en la mañana.	Una vez que los síntomas mejoren.	Una vez que los síntomas mejoren o como lo indique el proveedor de salud.	Una vez que el tratamiento apropiado ha sido aplicado en casa.	Después de haber sido evaluado por mi doctor y tengo una nota para regresar a clases.	Una vez de sea dado de alta por mi proveedor de salud.
--	--	-----------------------------------	---	--	---	--