

# Коли потрібно залишати вашу дитину вдома

Шановні батьки чи опікуни,  
Залишайте ваших дітей вдома, якщо:

- вони занадто хворі, щоб брати участь у повсякденних активностях.
- Потребують такого рівня догляду або спостереження, який неможливо забезпечити в школі.
- Створюють нездорове або небезпечне середовище для інших.

Ваша дитина повинна залишатися вдома, якщо у неї є одне з наступних захворювань або станів:

<b>Вітряна віспа (вітрянка)</b>	Тримайте дитину вдома, поки всі пухирці не покриються скоринкою, і нові пухирці припинять з'являтися.
<b>Діарея</b>	Тримайте дитину вдома, поки діарею не вдасться контролювати і частота відвідування туалету не повернеться до норми. Тримайте дитину вдома, якщо в калових масах є кров або слиз.
<b>Жар (висока температура)</b>	Тримайте дитину вдома, поки її температура не знизиться до 100,4°F і нижче та протримається протягом 24 годин (без застосування жарознижувальних препаратів) і якщо немає змін у поведінці, болю в горлі, висипу, блювання, діареї, болю в вухах, дратівливості або сплутаності свідомості.
<b>Грип, COVID-19, РСВ (Респіраторно-синцитіальний вірус)</b>	Тримайте дитину вдома, поки не минуть симптоми, жар спаде, та стабільна температура протримається протягом 24 годин (без медичних препаратів).
<b>Кір</b>	Тримайте дитину вдома до 4 днів після появи висипу.
<b>Паротит (свинка)</b>	Тримайте дитину вдома до 5 днів після початку набряку.
<b>Стригучий лишай</b>	Тримайте дитину вдома, поки не буде розпочато лікування.
<b>Короста</b>	Тримайте дитину вдома, поки не розпочнеться лікування.
<b>Скарлатина</b>	Тримайте дитину вдома, поки вона не приймала антибіотики протягом 24 годин, і жар не спав.
<b>Оперізуючий лишай</b>	Тримайте дитину вдома, поки висип не можна буде накрити або поки всі ураження не покриються скоринкою.
<b>Шкірна інфекція</b>	Тримайте дитину вдома, якщо у неї є: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Відкриті рани, що виділяють рідину, і ви не можете накрити водонепроникною пов'язкою.</li> <li>• Виразки в роті з слиновиділенням.</li> </ul> Дитина може відвідувати колектив після того, як симптоми зникнуть або після оцінки та лікування медичним працівником.
<b>Ангіна</b>	Тримайте дитину вдома, поки вона не приймала антибіотики протягом 24 годин, і жар спаде.
<b>Блювання</b>	Тримайте дитину вдома, поки блювання не припиниться протягом 24 годин, і дитина зможе брати участь у звичайних активностях.
<b>Коклюш</b>	Тримайте дитину вдома, поки вона не приймала антибіотики протягом 5 повних днів.
<b>Інші інфекційні захворювання</b>	Узгодьте зі школою вашої дитини або з медичним працівником.

Ці стани **не вимагають**, щоб ви тримали дитину вдома (якщо тільки вона не занадто хвора, щоб брати участь у звичайних активностях):

- Бронхіт.
- Застуда (без температури).
- Цитомегаловірус (ЦМВ).
- Інфекція вуха.
- Інфекційна еритема.
- Хвороба рук, ніг та рота.
- Контагіозний молюск.
- Мононуклеоз.
- Кон'юнктивіт.
- Аскаридоз (гострики).
- Пневмонія.
- Бородавки.

Департамент охорони здоров'я, медичні працівники або школи можуть робити винятки до цих вимог у кожному конкретному випадку.