HOUSTON HEALTH DEPARTMENT

MEASLES

It isn't just a little rash!

Measles can be dangerous, especially for babies and young children.



Measles symptoms include:

- High fever (may spike to over 104° F)
- Cough
- Red, watery eyes
- Runny nose
- Rash 3–5 days after symptoms begin

Severe complications of measles include hearing loss, pneumonia, and encephalitis (brain swelling) that can lead to disability and death.

Give your child **safe** and **long-lasting** protection against measles by ensuring they receive the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine according to the CDC's recommended schedule:



- First dose: between **12 and 15 months** of age.
- Second dose: between **4 and 6 years** of age.

Two doses of the MMR vaccine are 97% effective against measles.

For more information, visit: www.cdc.gov/measles

02/2025

HOUSTONHEALTH.ORG
Houston Health Department
8000 North Stadium Drive, Houston, TX 77054 832-393-5169

HOUSTON HEALTH DEPARTMENT

SARAMPIÓN

¡No es sólo un pequeño sarpullido!

El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños jóvenes.



Los síntomas del sarampión incluyen:

- Fiebre alta (puede subir a más de 104° F)
- Tos
- Ojos rojos y llorosos
- Goteo nasal
- Sarpullido 3-5 días después de que empiezan los síntomas

Los síntomas graves del sarampión incluyen la pérdida de audición, la neumonía y la encefalitis (inflamación del cerebro) que pueden provocar la discapacidad y la muerte.

Dale a sus hijos protección **segura** y **duradera** contra el sarampión por recibiendo la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) según el calendario de vacunas recomendado por el CDC:



- Primera dosis: entre los **12 y 15 meses** de edad.
- Segunda dosis: entre **4 y 6 años** de edad.

Dos dosis de la vacuna MMR tienen una eficacia de 97% contra el sarampión.

Para más información, visite: www.cdc.gov/measles

HOUSTONHEALTH.ORG
Houston Health Department
8000 North Stadium Drive, Houston, TX 77054 832-393-5169