

2025-2026 MISSOURI SCHOOL IMMUNIZATION REQUIREMENTS

- All students must present documentation of up-to-date immunization status, including month, day, and year of each immunization before attending school.
- The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) allows a 4-day grace period. Students in all grade levels may receive immunizations up to four days before the due date.
- Missouri-required immunizations should be administered according to the current ACIP schedule, including all spacing, (CDC.Gov/vaccines/schedules).
- To remain in school, students “in progress” must have an Immunizations In Progress form (Imm.P.14) on file. In progress means that a child has begun the vaccine series and has an appointment for the next dose. This appointment must be kept and an updated record provided to the school. If the appointment is not kept, the child is no longer in progress and is noncompliant. (i.e., Hep B vaccine series was started but the child is not yet eligible to receive the next dose in the series.)
- Religious (Imm.P.11A) and Medical (Imm.P.12) exemptions are allowed. The appropriate exemption form must be on file. Unimmunized children are subject to exclusion from school when outbreaks of vaccine preventable diseases occur.

Vaccines	Dose Required by Grade												
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DTaP/DTP/DT ¹	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
Tdap ²									1	1	1	1	1
MCV ³ (Meningococcal Conjugate)									1	1	1	1	2
IPV (Polio) ⁴	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
MMR ⁵	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hepatitis B ⁶	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
Varicella ⁷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1. Last dose on or after the fourth birthday and the last dose of pediatric pertussis before the seventh birthday. **Maximum needed: six doses.**
2. 8-12 Grades: Tdap, which contains pertussis vaccine, is required.
3. Grade 8-11: One dose of MCV is required. Dose must be given after 10 years of age.
Grade 12: Two doses of MCV are required unless the first dose was administered to a student who was 16 years of age or older, in which case only one dose is required. At least one dose must be given after 16 years of age.
4. Kindergarten-12 Grade: Last dose must be administered on or after the fourth birthday. The interval between the next-to-last and last dose should be at least six months.
5. First dose must be given on or after twelve months of age. If MMR and Varicella are not administered on the same day, they must be at least 28 days apart. The 4-day grace period does not apply to live vaccines.
6. There must be at least four weeks between dose one and two; at least 8 weeks between dose two and three; at least 16 weeks between doses one and three and final dose must be given no earlier than 24 weeks of age.
7. First dose must be given on or after twelve months of age. If Varicella and MMR are not administered on the same day, they must be at least 28 days apart. The 4-day grace period does not apply to live vaccines.

Kindergarten-12 Grade: As satisfactory evidence of disease, a licensed health care provider may sign and place on file with the school a written statement documenting the month and year of previous varicella (chickenpox) disease.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN ESCOLAR DE MISURI 2025-2026

- Todos los estudiantes deben presentar documentación del estado de vacunación actualizado, que incluya el día, el mes y el año de cada vacunación antes de asistir a la escuela.
- El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) permite un período de gracia de 4 días. Los estudiantes de todos los niveles de grado pueden recibir las vacunas hasta cuatro días antes de la fecha límite.
- Las vacunas exigidas en Misuri deben administrarse de acuerdo con el calendario actual del ACIP, incluidos todos los intervalos (CDC.Gov/vaccines/schedules).
- Para permanecer en la escuela, los estudiantes «en curso» deben tener archivado un formulario de vacunación en curso (Imm.P.14). En curso significa que el niño ha comenzado la serie de vacunas y tiene una cita para recibir la siguiente dosis. Se debe asistir a esta cita y se debe proporcionar un registro actualizado a la escuela. Si no se acude a la cita, el niño ya no estará en curso y no cumple con las normas. (p. ej., se inició la serie de vacunas contra la hepatitis B, pero el niño aún no es elegible para recibir la siguiente dosis de la serie).
- Se permiten exenciones religiosas (Imm.P.11A) y médicas (Imm.P.12). El formulario de exención correspondiente debe estar archivado. Los niños no vacunados están sujetos a la exclusión de la escuela cuando se producen brotes de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.

Vacunas	Dosis requerida por grado												
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DTaP/DTP/DT ¹	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
Tdap ²									1	1	1	1	1
MCV ³ (Conjugado meningocócico)									1	1	1	1	2
IPV (poliomielitis) ⁴	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
MMR ⁵	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hepatitis B ⁶	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+	3+
Varicela ⁷	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

1. Última dosis a los cuatro años o después y la última dosis de tos ferina pediátrica antes de los siete años.
Máximo necesario: seis dosis.
2. Grados 8 a 12: se requiere la vacuna Tdap, que contiene la vacuna contra la tos ferina.
3. Grados 8 a 11: se requiere una dosis de MCV. La dosis debe administrarse después de los 10 años.
Grado 12: se requieren dos dosis de MCV, a menos que la primera dosis se haya administrado a un estudiante de 16 años o más, en cuyo caso solo se requiere una dosis. Se debe administrar al menos una dosis después de los 16 años.
4. Jardín de infantes-Grado 12: la última dosis debe administrarse a los cuatro años o después. El intervalo entre la penúltima dosis y la última dosis debe ser de al menos seis meses.
5. La primera dosis debe administrarse a los doce meses de edad o después. Si la MMR y la varicela no se administran el mismo día, deben tener un intervalo de al menos 28 días. El período de gracia de 4 días no se aplica a las vacunas vivas.
6. Deben transcurrir al menos cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis; al menos 8 semanas entre la segunda y la tercera dosis; al menos 16 semanas entre la primera y la tercera dosis y la dosis final no debe administrarse antes de las 24 semanas de edad.
7. La primera dosis debe administrarse a los doce meses de edad o después. Si la varicela y la MMR no se administran el mismo día, deben tener un intervalo de al menos 28 días. El período de gracia de 4 días no se aplica a las vacunas vivas.

Jardín de infantes-Grado 12: Como prueba satisfactoria de la enfermedad, un proveedor de atención médica autorizado puede firmar y archivar en la escuela una declaración escrita en la que se documente el mes y el año de la enfermedad anterior por varicela.