

학교 질병 지침

다음 지침은 학생이 언제 집에 머물거나 학교에서 집으로 가야 하는지 결정하는 데 도움이 되도록 개발되었습니다.

대부분의 상황에서 새롭고, 설명할 수 없는 증상이 나타난 학생은 증상이 경미하거나, 호전되거나 비감염성 원인에 의한 것이라는 사실이 명확해질 때까지 학교로 돌아와서는 안 됩니다. 어떤 경우에는 의료 서비스 제공자의 문서를 요청할 수 있습니다.

| | |
|-----------------------|---|
| 코로나19 양성 | <ul style="list-style-type: none"> 24시간 동안 열이 나지 <u>않고</u> 증상이 호전될 때까지 집에 머물러야 합니다. |
| 증상 | 학생이 집에 머물거나 학교에서 집으로 가야 합니까? |
| 발열 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 발열 100.4°F 이상, 학생이 아프거나 학교 활동에 편안하게 참여할 수 없는 경우 해열제를 사용하지 않고 24시간 동안 열이 나지 않을 때까지 반드시 집에 머물러야 합니다. |
| 울혈: 콧물/기침/인후통 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 학생이 아프게 보이거나/ 행동하거나 학교 활동에 편안하게 참여할 수 없는 경우. 호흡 곤란 쉽게 관리되지 않는 지속적인 기침이나 콧물 쌩쌩거림 (호흡곤란), 이전에 진단받고 치료하지 않은 경우 |
| 두통 피로/근육통 또는 몸살 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴식을 취한 후에도 증상이 사라지지 않는 경우 학생이 아프게 보이거나/ 행동하거나 학교 활동에 편안하게 참여할 수 없는 경우 최근 머리 부상 병력 |
| 설사/구토 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 24시간 이내 설사/구토, 마지막 에피소드 이후 24시간 동안 집에 머무릅니다. 학생이 아프게 보이거나/ 행동하거나 학교 활동에 편안하게 참여할 수 없는 경우 기저귀를 착용하고 대변이 기저귀에 담겨 있지 않는 경우 최근 머리 부상 병력 |
| 눈 자극 및/또는 결막염/ 결막염 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 노란색/점액 분비물이 많이 있는 충혈된 눈 교실에서 발병이 발생했거나 의료 서비스 제공자가 권장한 경우 |
| 발진 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 심각한 발진 액체가 누출되는 진물이 있거나/열린 상처 <p>발진이 없거나 학생의 상태가 비감염성임을 나타내는 의료 서비스 제공자의 소견서를 가지고 학교로 돌아올 수 있습니다.</p> |
| 복통 | <p>다음의 경우라면 그렇습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 학생이 아프게 보이거나/ 행동하거나, 학교 활동에 편안하게 참여할 수 없는 경우 심한 통증 설사나 구토, 피가 섞인/검은 변, 부상 후 복통과 관련되어 있는 경우 |