

Hướng Dẫn Về Bệnh Tật Của Học Sinh Trong Học Khu Westminster

Quý vị theo hướng dẫn dưới đây để quyết định khi nào con em cần ở nhà hoặc đang học ở trường phải đi về nhà

Trong đa số các trường hợp, bất kỳ học sinh nào có triệu chứng mới, không giải thích được, sẽ không được quay lại trường học cho đến khi biết rõ là các triệu chứng nhẹ, đang giảm dần hoặc do vì nguyên nhân không phải là bệnh truyền nhiễm.

Trong một số trường hợp, học sinh phải có giấy tờ chứng nhận của bác sĩ.

CÁC TRIỆU CHỨNG	Học sinh có nên ở nhà hoặc đang học ở trường phải đi về nhà không?
Sốt	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Sốt 100.4°F trở lên, hoặc học sinh nhìn có vẻ như bị bệnh hoặc không cảm thấy dễ chịu khi tham gia các sinh hoạt của trường học Phải: Ở nhà 24 giờ đồng hồ kể từ khi hết sốt mà không phải uống thuốc hạ sốt
Nghẹt Mũi/Chảy Nước Mũi/Ho/Đau Cổ Họng	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Học sinh nhìn có vẻ như bị bệnh hoặc không cảm thấy dễ chịu khi tham gia sinh hoạt của trường họcKhó thởHo lâu hoặc bị chảy nước mũi không dễ ngưng đượcThở rít, nếu không được khám và chữa trị trước đó
Nhức Đầu Mệt Mỏi/Đau Bắp Thịt Hoặc Đau Thân Thể	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Nếu không hết triệu chứng sau khi nghỉ ngơiHọc sinh nhìn có vẻ như bị bệnh hoặc không cảm thấy dễ chịu khi tham gia vào sinh hoạt của trường họcBị thương ở đầu mới đây
Tiêu Chảy/Ói Mửa	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Tiêu chảy/Ói mửa 2 lần trở lên trong 24 giờ đồng hồ trước đó, ở nhà 24 giờ đồng hồ kể từ lần cuối bị tiêu chảy/ói mửaHọc sinh nhìn có vẻ như bị bệnh hoặc không cảm thấy dễ chịu khi tham gia sinh hoạt của trường họcHọc sinh mang tã và không kiểm soát phân trong tãBị thương ở đầu mới đây
Ngứa Mắt và hoặc Mắt Đỏ Gây Lây Lan	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Mắt đỏ với ghèn màu vàng/đặcCó lây lan trong lớp học hoặc có đề nghị của nhân viên y tế <p>> <i>Nếu mắt không có ghèn-học sinh vẫn có thể đi học</i></p>
Sảy Ngứa	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Sảy ngứa nhiềuVết thương chảy nước/hở <p>> <i>Nếu sảy ngứa không chảy nước & được băng lại bằng băng keo y tế nhỏ (bandage), học sinh vẫn có thể đi học</i></p> Phải: Học sinh có thể quay lại trường học khi không còn sảy ngứa hoặc có giấy bác sĩ chứng nhận là tình trạng của học sinh không bị lây lan
Đau Bụng	Có, nếu <ul style="list-style-type: none">Học sinh nhìn có vẻ như bị bệnh hoặc không cảm thấy dễ chịu khi tham gia sinh hoạt của trường họcĐau bụng dữ dội, liên tục hơn hai giờ đồng hồKèm theo tiêu chảy hoặc ói mửa, phân có máu/màu đen, hoặc đau bụng sau khi bị thương