

Año escolar 2025-26

Requisitos de vacunación del estado de Nueva York
para el ingreso/asistencia a la escuela¹

NOTAS:
Todos los niños deben estar vacunados según su edad para asistir a la escuela en el estado de Nueva York. El número de dosis depende del calendario recomendado por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP). Los intervalos entre las dosis de la vacuna deben ajustarse a la “[Calendario de vacunación infantil y adolescente recomendado por el ACIP](#)” Las dosis recibidas antes de la edad mínima o de los intervalos indicados en el calendario no son válidas y no cuentan para el número de dosis que se indica a continuación. Consulte las notas al pie para obtener información específica sobre cada vacuna. Los niños que se matriculan en clases sin grado deben cumplir con los requisitos de vacunación de los grados a los que corresponden por edad.

Los requisitos de dosis DEBEN leerse con las notas al pie de este programa.

Vacunas	Pre Jardín de infancia (Guardería, Ventaja inicial, Guardería o Pre-K)	Jardín de infancia y grados 1, 2, 3, 4 y 5	Grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11	Calificación 12
Difteria y tétanos que contiene toxoide vacuna y tos ferina vacuna (DTaP/DTP/Tdap/Td) ²	4 dosis	5 dosis o 4 dosis Si la 4ta dosis se recibió a los 4 años o mayor y la serie se inició en menos de 1 año de edad o 3 dosis Si tiene 7 años o más y la serie fue comenzó a los 1 año o más	3 dosis	
Tétanos y difteria que contiene toxoide vacuna y tos ferina vacuna adolescente refuerzo (Tdap) ³	No aplicable			1 dosis administrado después de los 10 años
Vacuna contra la polio (IPV/OPV) ⁴	3 dosis	4 dosis o 3 dosis si la 3ª dosis se recibió a los 4 años o más viejo		
Sarampión, paperas y vacuna contra la rubéola (Vacuna triple vírica) ⁵	1 dosis	2 dosis		
Vacuna contra la hepatitis B ⁶	3 dosis	3 dosis o 2 dosisde vacuna contra la hepatitis B para adultos(Recombivax) para niños que recibieron las dosis con al menos 4 meses de diferencia y entre las edades de 11 años a través de 15 años		
Varicela (Varicela) vacuna ⁷	1 dosis	2 dosis		
Meningococo vacuna conjugada (Hombres ACWY) ⁸	No aplicable			Calificacio nes 7, 8, 9, 10 y 11: 1 dosis Grado 12: 2 dosis o 1 dosisSi el La dosis fue recibido a los 16 años o más
Haemophilus influenzae tipo b vacuna conjugada (Hib) ⁹	1 a 4 dosis	No aplicable		
Neumococo vacuna conjugada (PCV) ¹⁰	1 a 4 dosis	No aplicable		



1. La evidencia serológica demostrada de anticuerpos contra sarampión, paperas o rubéola, o la confirmación de laboratorio de estas enfermedades, es una prueba aceptable de inmunidad a estas

enfermedades. Las pruebas serológicas para polio son una prueba aceptable de inmunidad solo si se realizaron antes del 1 de septiembre de 2019 y los tres serotipos dieron positivo. Un análisis de sangre

positivo para anticuerpos de superficie de la hepatitis B es una prueba aceptable de inmunidad a la hepatitis B. La evidencia serológica demostrada de anticuerpos contra la varicela, la confirmación de laboratorio de la varicela o el diagnóstico por parte de un médico, asistente médico o enfermero de que un niño ha tenido varicela es una prueba aceptable de inmunidad a la varicela.

*Los títulos serológicos nunca se aceptan para tétanos, difteria, tos ferina, meningococo, Haemophilus influenzae tipo b y enfermedades neumocócicas.

2. Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP). (Edad mínima: 6 semanas)

- a. Los niños que inician la serie a tiempo deben recibir una serie de 5 dosis de la vacuna DTaP a los 2, 4, 6, 15 y 18 meses, y a los 4 años o más. La cuarta dosis puede administrarse a partir de los 12 meses, siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la tercera dosis. Sin embargo, no es necesario repetir la cuarta dosis de DTaP si se administró al menos 4 meses después de la tercera dosis. La última dosis de la serie debe administrarse al cumplir los 4 años o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.
 - b. Si la cuarta dosis de DTaP se administró a los 4 años o más, y al menos 6 meses después de la dosis 3, no se requiere la quinta dosis (de refuerzo) de la vacuna DTaP.
 - c. Los niños de 7 años o más que no estén completamente vacunados con la serie de vacunas DTaP infantiles deben recibir la vacuna Tdap como primera dosis de la serie de vacunación de refuerzo; si se necesitan dosis adicionales, se deben administrar las vacunas Td o Tdap. Si recibieron la primera dosis antes de su primer cumpleaños, se requieren 4 dosis, siempre que la dosis final se haya recibido a los 4 años o más. Si recibieron la primera dosis el mismo día o después del primer cumpleaños, se requieren 3 dosis, siempre que la dosis final se haya recibido a los 4 años o más.
 - d. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para niños de 4 meses a 6 años de edad.](#)
- mi. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para niños de 7 a 9 años de edad.](#)

3. Vacuna de refuerzo contra el tétanos, la difteria y la tos ferina acelular (Tdap) para adolescentes. (Edad mínima para 6.º a 11.º grado: 10 años; edad mínima para 12.º grado: 7 años).

- a. Los estudiantes de 11 años o más que ingresen al grado 6 al 12 deben recibir una dosis de Tdap.
- b. Además del requisito de 6.º a 12.º grado, la vacuna Tdap también puede administrarse como parte de la serie de vacunación de recuperación para estudiantes de 7 años o más que no estén completamente vacunados con la serie DTaP infantil, como se describió anteriormente. En el año escolar 2025-26, solo las dosis de Tdap administradas a los 10 años o más cumplirán con el requisito de Tdap para los estudiantes de 6.º a 11.º grado; sin embargo, las dosis de Tdap administradas a los 7 años o más cumplirán con el requisito para los estudiantes de 12.º grado.
- c. Los estudiantes que tengan 10 años y estén en sexto grado y que aún no hayan recibido la vacuna Tdap deberán cumplir con la vacunación hasta que cumplan 11 años.
- d. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para niños de 10 a 18 años de edad.](#)

4. Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI) o vacuna antipoliomielítica oral (VPO). (Edad mínima: 6 semanas)

- a. Los niños que comienzan la serie a tiempo deben recibir la vacuna IPV a los 2 meses, a los 4 meses, entre los 6 y los 18 meses, y a los 4 años o más. La última dosis de la serie debe administrarse al cumplir los 4 años o después, y al menos 6 meses después de la dosis anterior.
- b. Para los estudiantes que recibieron su cuarta dosis antes de los 4 años y antes del 7 de agosto de 2010, 4 dosis separadas por al menos 4 semanas son suficientes.
- c. Si la tercera dosis de la vacuna contra la polio se recibió a los 4 años o más y al menos 6 meses después de la dosis anterior, no se requiere la cuarta dosis de la vacuna contra la polio.
- d. Para los niños con antecedentes de VPO, solo la VPO trivalente (tOPV) cuenta para los requisitos de vacunación contra la polio en las escuelas del estado de Nueva York. Las dosis de VPO administradas antes del 1 de abril de 2016 deben contabilizarse, a menos que se indique específicamente como monovalente, bivalente o administrada durante un período de poliovirus. Campaña de inmunización. Las dosis de OPV administradas a partir del 1 de abril de 2016 no deben contabilizarse.

mi. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para Niños de 4 meses a 17 años de edad.](#)

5. Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). (Edad mínima: 12 meses)

- a. La primera dosis de la vacuna triple vírica debe haberse recibido al cumplir un año o después. La segunda dosis debe haberse recibido al menos 28 días (4 semanas) después de la primera para que se considere válida.
- b. Sarampión: Se requiere una dosis para preescolar. Se requieren dos dosis para preescolar a 12.º grado.
- c. Paperas: Se requiere una dosis para preescolar. Se requieren dos dosis para preescolar hasta 12.º grado.
- d. Rubéola: Se requiere al menos una dosis para todos los grados (desde preescolar hasta 12.º grado).

6. Vacuna contra la hepatitis B

- a. La dosis 1 puede administrarse al nacer o en cualquier momento posterior. La dosis 2 debe administrarse al menos 4 semanas (28 días) después de la dosis 1. La dosis 3 debe administrarse al menos 8 semanas después de la dosis 2 Y al menos 16 semanas después de la dosis 1 Y no antes de las 24 semanas de edad (cuando se administran 4 dosis, sustituir «dosis 4» por “dosis 3” en estos cálculos).
- b. Dos dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax) recibidas con al menos 4 meses de diferencia entre los 11 y los 15 años de edad cumplirán con el requisito.

7. Vacuna contra la varicela. (Edad mínima: 12 meses)

- a. La primera dosis de la vacuna contra la varicela debe haberse recibido al cumplir un año o después. La segunda dosis debe haberse recibido al menos 28 días (4 semanas) después de la primera para que sea válida.
- b. Para niños menores de 13 años, el intervalo mínimo recomendado entre dosis es de 3 meses (si la segunda dosis se administró al menos 4 semanas después de la primera, se considerará válida); para personas de 13 años o más, el intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas.

8. Vacuna antimeningocócica conjugada ACWY (MenACWY). (Edad mínima para alumnos de 7.º a 12.º grado: 10 años).

- a. Se requiere una dosis de la vacuna conjugada antimeningocócica para los estudiantes que ingresan a los grados 7, 8, 9, 10 y 11.
- b. Para los estudiantes de 12.º grado, si la primera dosis de la vacuna conjugada antimeningocócica se recibió a los 16 años o más, no se requiere la segunda dosis (de refuerzo).
- c. La segunda dosis debe haberse recibido a los 16 años o más. El intervalo mínimo entre dosis es de 8 semanas.

9. Vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib). (Edad mínima: 6 semanas)

- a. Los niños que comienzan la serie a tiempo deben recibir la vacuna contra el Hib a los 2, 4 y 6 meses, y entre los 12 y los 15 meses. Los niños mayores de 15 meses deben ponerse al día según el calendario de vacunación del ACIP. La última dosis debe administrarse a los 12 meses o después.
- b. Si se recibieron 2 dosis de la vacuna antes de los 12 meses de edad, solo se requieren 3 dosis, siendo la dosis 3 entre los 12 y los 15 meses y al menos 8 semanas después de la dosis 2.
- c. Si la dosis 1 se recibió entre los 12 y los 14 meses de edad, solo se requieren 2 dosis y la dosis 2 al menos 8 semanas después de la dosis 1.
- d. Si la dosis 1 se recibió a los 15 meses o más, solo se requiere 1 dosis.
- e. La vacuna contra el Hib no es necesaria para niños de 5 años o más.
- f. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para niños sanos de 4 meses a 4 años de edad.](#)

10. Vacuna antineumocócica conjugada (PCV). (Edad mínima: 6 semanas)

- a. Los niños que comienzan la serie a tiempo deben recibir la vacuna PCV a los 2, 4 y 6 meses, y entre los 12 y los 15 meses*. Los niños mayores de 15 meses deben ponerse al día según el calendario de vacunación del ACIP. La última dosis debe administrarse a los 12 meses o después.
- b. Los niños no vacunados de 7 a 11 meses deben recibir 2 dosis, con al menos 4 semanas de diferencia, seguidas de una tercera dosis entre los 12 y los 15 meses.
- c. Los niños no vacunados de 12 a 23 meses deben recibir 2 dosis de la vacuna con al menos 8 semanas de diferencia.
- d. Si se recibió una dosis de vacuna a los 24 meses o más, no se requieren dosis adicionales.
- e. La vacuna PCV no es necesaria para niños de 5 años o más.
- f. [Para obtener más información, consulte la Guía de actualización de los CDC para niños sanos de 4 meses a 4 años de edad.](#)

*Dependiendo de la marca de la vacuna, el calendario puede cambiar.

Para más información, contactar con:

Departamento de Salud del Estado de Nueva York
División de Excelencia en Vacunas
Habitación 649, Torre Corning ESP
Albany, Nueva York 12237
(518) 473-4437

Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York
Unidad de Cumplimiento Escolar, Oficina de Inmunización
42-09 Calle 28, 5to piso
Long Island City, Nueva York 11101
(347) 396-2433

Departamento de Salud del Estado de Nueva York/División de Excelencia en Vacunas