

Al tratar de decidir si un niño debe ser enviado a la escuela o mantenido en casa, considere estas pautas al tomar esas decisiones.

Los niños deben permanecer en casa si experimentan alguno de estos síntomas la noche anterior o la mañana en que van a la escuela.

Nausea o vómito: dos o más veces

Diarrea: dos o más defecaciones sueltas o acuosas

Fiebre: temperatura oral de 100 grados o más

Cualquier líquido o drenaje que salga del oído

Salpullido o erupción desconocida que no haya sido evaluado por un médico

Cualquier llaga en la piel que drene y no se pueda mantener limpia con un vendaje

Sibilancias, tos ronca y/o tos que produce moco verde

Tiña: infección micótica o de hongos que no ha sido evaluada por un médico

Llame al proveedor de atención primaria de su hijo para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Algunas afecciones requerirán un medicamento recetado y el niño deberá ser visto por el proveedor. La escuela de su hijo (a) puede solicitar una prueba de evaluación del proveedor de atención primaria. Siga las instrucciones del proveedor acerca de cuándo regresar a la escuela.

Siga las pautas adicionales que tenga la escuela de su hijo(a) con respecto a la asistencia y las enfermedades infecciosas. Su cooperación con estas pautas ayudará a mantener un ambiente escolar saludable para su hijo(a).

Afecciones contagiosas comunes:

Varicela	Permanecer fuera de la escuela por los primeros seis días o hasta que la última ampolla se seque o forme costra.
Quinta Enfermedad	Puede asistir a la escuela con la erupción si su niño(a) se siente bien. Informe a la escuela si a su hijo(a) se le diagnosticó esto debido a algunas precauciones que deben tomarse para la exposición. Las mujeres embarazadas deben notificar a su proveedor de atención médica sobre cualquier exposición conocida a la quinta enfermedad.
Piojos	Puede regresar a la escuela después del tratamiento con champú especial o tratamiento con aceite. Todos los insectos vivos deben ser eliminados del pelo. Los padres deben acompañar al niño a la escuela para que se revise el pelo antes de regresar a clase.
Gripa	Si tiene síntomas de gripa, la recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC – por sus siglas en inglés) es permanecer en casa por al menos 24 horas después de finalizar la fiebre (sin el uso de medicamento para reducir la fiebre).
Norovirus	Debe quedarse en casa por 24 horas después del último episodio de vómito y diarrea. Un buen lavado de manos debe hacerse cumplir estrictamente.
Conjuntivitis	Depende del diagnóstico médico: puede ser contagioso y necesitar medicamento.

