

IMMUNIZE

Prevent Disease – Get Immunized! Pennsylvania School Vaccination Requirements

VACCINES	KINDERGARTEN & GRADES 1-6	GRADES 7-11	GRADE 12
Diphtheria, Tetanus, and Acellular Pertussis (Usually given as DTaP, DTP, DT, or Td) 1 dose on or after 4th birthday	4 doses	4 doses	4 doses
Polio 4th dose on or after 4th birthday and at least 6 months after previous dose given	4 doses A 4th dose is not necessary if the 3rd dose was administered at age 4 years or older and at least 6 months after the previous dose	4 doses A 4th dose is not necessary if the 3rd dose was administered at age 4 years or older and at least 6 months after the previous dose	4 doses A 4th dose is not necessary if the 3rd dose was administered at age 4 years or older and at least 6 months after the previous dose
Measles, Mumps, and Rubella (Usually given as MMR)	2 doses	2 doses	2 doses
Hepatitis B	3 doses	3 doses	3 doses
Varicella (Chickenpox)	2 doses or evidence of immunity	2 doses or evidence of immunity	2 doses or evidence of immunity
Tetanus, Diphtheria, Acellular Pertussis (Tdap)	Not applicable	1 dose	1 dose
Meningococcal Conjugate (MenACWY)	Not applicable	1 dose	2 doses A 2nd dose of MenACWY is not necessary if the 1st dose was given at age 16 years of age or older

For more information on the vaccines your child needs to attend school, talk to your healthcare provider, school nurse, or visit www.montgomerycountypa.gov/immunizations

VACUNAR

¡Prevenga la enfermedad, vacúnate! Requisitos de vacunación escolar de Pennsylvania

VACUNAS	KÍNDER & GRADOS 1-6	GRADOS 7-11	GRADO 12
Difteria, tétano, y tos ferina acelular (Usualmente dado como DTaP, DTP, DT, o Td) (1 dosis en o después de su 4to cumpleaños)	4 dosis	4 dosis	4 dosis
Polio (4ta dosis en o después de su 4to cumpleaños y por lo menos 6 meses después de la previa dosis)	4 dosis (Una 4ta dosis no es necesaria si la 3ra dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayor y por lo menos 6 meses después de la previa dosis)	4 dosis (Una 4ta dosis no es necesaria si la 3ra dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayor y por lo menos 6 meses después de la previa dosis)	4 dosis (Una 4ta dosis no es necesaria si la 3ra dosis fue administrada a la edad de 4 años o mayor y por lo menos 6 meses después de la previa dosis)
Sarampión, Paperas, & Rubeola (Usualmente dado como MMR)	2 dosis	2 dosis	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis	3 dosis	3 dosis
Varicela	2 dosis o evidencia de inmunidad	2 dosis o evidencia de inmunidad	2 dosis o evidencia de inmunidad
Tétano, difteria, y tos ferina acelular (Tdap)	No es aplicable	1 dosis	1 dosis
Meningocócica Conjugada (MenACWY)	No es aplicable	1 dosis	2 dosis Una segunda dosis de MenACWY no es necesaria si la primera dosis fue recibida a los 16 años de edad o más.

Para más información sobre las vacunas que su hijo/a necesita para asistir a la escuela, hable con su profesional médico, enfermera de la escuela o visite www.montgomerycountypa.gov/immunizations