

# Resumen de vacunación de Ohio para la asistencia escolar, 2026-2027



| Vacuna/Grado                                                                  | Jardín (K) | 1.º           | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º           | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|------|------|------|------------------|
| <b>DTaP</b><br>Difteria,<br>tétanos,<br>tos ferina                            |            | 4 o más dosis |     |     |     |     |     |               |     |     |      |      |      |                  |
| <b>Hep B</b><br>Hepatitis B                                                   |            | 3 o más dosis |     |     |     |     |     |               |     |     |      |      |      |                  |
| <b>MMR</b><br>Sarampión,<br>paperas,<br>rubeola                               |            | 2 dosis       |     |     |     |     |     |               |     |     |      |      |      |                  |
| <b>Polio</b>                                                                  |            | 3 o más dosis |     |     |     |     |     |               |     |     |      |      |      |                  |
| <b>Varicela</b><br>(Varicela)                                                 |            | 2 dosis       |     |     |     |     |     |               |     |     |      |      |      |                  |
| <b>Tdap</b><br>Tétanos,<br>difteria,<br>tos ferina                            |            |               |     |     |     |     |     | 1 dosis       |     |     |      |      |      |                  |
| <b>MCV4</b><br>Vacuna<br>Antimeningocócica<br>Conjugada<br>Tetraivalente ACWY |            |               |     |     |     |     |     | Primera dosis |     |     |      |      |      | Segunda<br>dosis |

## Notas importantes:

- Las dosis de las vacunas administradas hasta cuatro días antes del intervalo mínimo o de la edad mínima son válidas (período de gracia). Las dosis administradas con cinco días de antelación, o antes, del intervalo mínimo o de la edad mínima no se consideran válidas y deben repetirse cuando la edad lo permita.
- Si la vacuna triple viral (MMR) y la de la varicela **no** se administran el mismo día, las dosis deben tener un intervalo de separación de al menos 28 días entre ellas, sin período de gracia.
- Para obtener más información, consulte el [Código Revisado de Ohio, 3313.67 y 3313.671](#) y [la entrada del diario del director del Departamento de Salud de Ohio \(ODH\)](#), acerca de los requisitos de vacunación escolar, las vacunas recomendadas y las exenciones a la vacunación.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Programa de Inmunización del Departamento de Salud de Ohio al 800-282-0546 o al 614-466-4643.**

## Detalles sobre los requisitos de vacunación escolar en Ohio

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DTaP</b><br/>Difteria,<br/>tétanos,<br/>tos ferina</p>                                     | <p><b>De jardín de infantes a 12.º grado</b></p> <p>Cuatro o más dosis de la vacuna DTaP o DT, o cualquier combinación. Si se han administrado las cuatro dosis antes de cumplir los cuatro años, es necesario administrar una quinta dosis. Si la cuarta dosis se administró al menos seis meses después de la tercera dosis, y a partir del cuarto cumpleaños, no es necesaria una quinta dosis.</p> <p><i>Los intervalos mínimos recomendados para la vacuna DTaP o DT en estudiantes de jardín de infantes son de cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis, y entre la segunda y la tercera dosis; y de seis meses entre la tercera y la cuarta dosis, y entre la cuarta y la quinta dosis.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Hep B</b><br/>Hepatitis B</p>                                                              | <p><b>De jardín de infantes a 12.º grado</b></p> <p>Tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B. La segunda dosis debe administrarse al menos 28 días después de la primera dosis. La tercera dosis debe administrarse al menos 16 semanas después de la primera dosis y al menos ocho semanas después de la segunda dosis. La última dosis de la serie (tercera o cuarta dosis) no debe administrarse antes de las 24 semanas de edad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>MMR</b><br/>Sarampión,<br/>paperas,<br/>rubéola</p>                                        | <p><b>De jardín de infantes a 12.º grado</b></p> <p>Dos dosis de la vacuna triple viral (MMR). La primera dosis debe administrarse a partir del primer cumpleaños. La segunda dosis debe administrarse al menos 28 días después de la primera dosis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Polio</b></p>                                                                              | <p><b>De jardín de infantes a 12.º grado</b></p> <p>Tres o más dosis de la vacuna antipolio inactivada VPI. La dosis FINAL debe administrarse a partir del cuarto cumpleaños, dejando un intervalo de al menos seis meses entre la dosis final y la anterior, independientemente del número de dosis administradas anteriormente.</p> <p><i>Si se administran tanto la vacuna antipoliomielítica oral trivalente (VPO) como la VPI como parte de una serie de vacunas, el número total de dosis necesarias para completar la serie es el mismo que el recomendado para el calendario de vacunación de VPI de EE. UU. Solo la vacuna oral trivalente VPO (tOPV) es válida para cumplir los requisitos de vacunación de los Estados Unidos. Las dosis de VPO administradas antes del 1 de abril de 2016 deben contarse como válidas (a menos que se indique expresamente que se administraron durante una campaña). Las dosis de VPO administradas a partir del 1 de abril de 2016 <b>no deben</b> tenerse en cuenta.</i></p> |
| <p><b>Varicela</b><br/>(Varicela)</p>                                                            | <p><b>De jardín de infantes a 12.º grado</b></p> <p>Se deben administrar dos dosis de la vacuna contra la varicela antes de la admisión. La primera dosis debe administrarse a partir del primer cumpleaños. La segunda dosis debe administrarse al menos tres meses después de la primera; no obstante, si la segunda dosis se administra al menos 28 días después de la primera, se considera válida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Tdap</b><br/>Tétanos,<br/>difteria,<br/>tos ferina</p>                                     | <p><b>7.º a 12.º grados</b></p> <p>Se debe administrar una dosis de la vacuna Tdap a partir del décimo cumpleaños. La vacuna Tdap se puede administrar independientemente del intervalo desde la última vacuna con toxoide tetánico o diftérico.</p> <p><i>A los niños de siete años o más con un historial incompleto de la vacuna DTaP se les debe administrar la vacuna Tdap como primera dosis de la serie de rescate. Si la serie se inició entre los siete y los nueve años, la cuarta dosis debe ser una vacuna Tdap administrada entre los 11 y los 12 años. Si la tercera dosis de la vacuna Tdap se administra a los 10 años, no es necesario administrar ninguna dosis adicional entre los 11 y los 12 años.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Meningocócica</b><br/>Vacuna<br/>Antimeningocócica<br/>Conjugada<br/>Tetravalente ACWY</p> | <p><b>7.º a 11.º grados</b></p> <p>Se debe administrar una dosis de la vacuna contra el meningococo (serogrupos A, C, W e Y) a partir del décimo cumpleaños.</p> <p><b>12.º grado</b></p> <p>Dos dosis de la vacuna contra el meningococo (serogrupos A, C, W e Y). Segunda dosis a partir de los 16 años. Si la primera dosis se administró a partir del día en que se cumplen los 16 años, solo es necesaria una dosis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |